



Evaluación económica de cladribina (Mavenclad®) en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad en Guatemala



El presente estudio fue desarrollado para:



AUTORES DEL ESTUDIO		
NOMBRE	GRADO ACADÉMICO	AFILIACIÓN
Herman Soto Molina	Maestría en Economía de la Salud	Consultor Privado
Osvaldo Díaz Álvarez	Químico Farmacéutico Biólogo	Consultor Privado
Yazmin Escobar Juárez	Maestría en Ciencias de la Salud	Consultor Privado
Rubio Ponce Rodrigo Abisai	Lic. en Actuaria	Consultor Privado

Los autores declaran que:

- ✓ Este estudio fue financiado mediante un *grant irrestricto* otorgado por Merck, S.A. de C.V.
- \checkmark El análisis de la información y la redacción del presente documento se realizaron bajo total autonomía.



Contenido

Abreviaturas	8
Glosario de términos	9
Resumen ejecutivo	10
Capítulo 1	13
1.1 Descripción de los temas abordados en el reporte	13
1.2 Declaración de la pregunta de investigación	13
1.3 Objetivo general del estudio	13
Capítulo 2	14
2.1 Introducción	14
2.1.1 Etiología	15
2.1.2 Fisiopatología	15
2.1.3 Factores de riesgo	16
2.1.4 Diagnóstico	16
2.1.5 Epidemiología	17
2.1.6 Carga de enfermedad	17
2.2 Recomendaciones de guías de práctica clínica	17
2.3 Descripción de la tecnología	20
2.3.1 Cladribina (Mavenclad®)	20
2.3.1.1 Principio activo, mecanismo de acción y farmacocinética	20
2.3.1.2 Grupo terapéutico, especialidad y servicio	20
2.3.1.3 Indicación terapéutica	21
2.3.1.4 Estado de regulación	21
2.3.1.5 Grupo de pacientes en los que se desea utilizar	21
2.3.1.6 Ventajas y desventajas del insumo propuesto	21
2.3.1.7 Duración de la aplicación de la intervención, vía de administración dosis y tipo de dispensación	
2.3.1.8 Tipo de instalaciones y capacitación de personal que se requiere el uso adecuado del insumo	-
2.4.1 Comparadores	23
2.4.2 Fingolimod	23
2.4.2.1 Principio activo, mecanismo de acción y farmacocinética	23



2.4.2.2 Grupo terapéutico, especialidad y servicio	23
2.4.2.3 Indicación terapéutica	24
2.4.2.4 Contraindicaciones	24
2.4.2.5 Estado de regulación	24
2.4.3 Natalizumab	24
2.4.3.1 Principio activo, mecanismo de acción y farmacocinética	24
2.4.3.2 Grupo terapéutico, especialidad y servicio	25
2.4.3.3 Indicación terapéutica	25
2.4.3.4 Contraindicaciones	25
2.4.3.5 Estado de regulación	25
Capítulo 3. Revisión de la evidencia económica	26
3.1 Objetivo	26
3.2 Metodología	26
3.3 Estrategias de búsqueda	27
3.4 Características de los estudios	28
3.5 Conclusiones	33
Capítulo 4. Metodología de la evaluación económica del uso de cladribir (MAVENCLAD®) en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente	
actividad de la enfermedad	34
4.1 Alcance y objetivos	34
4.2 Tipo de evaluación económica	34
4.3 Tipo de análisis conducido	34
4.4 Población objetivo	
4.5 Comparadores	
4.6 Perspectiva del análisis	
4.7 Datos de eficacia/efectividad y seguridad	
4.8 Horizonte temporal	
4.9 Modelaje	
4.10 Utilización de recursos y costos	36
4.11 Tasa de descuento	
4.12 Variabilidad e incertidumbre	39
Capítulo 5 Resultados del Estudio de Evaluación Económica	/1



5.1 Resultados de la minimización de costos	41
5.2 Resultados del análisis de sensibilidad	42
Capítulo 6. Discusión	45
6.1 Resumen de resultados	45
6.2 Limitaciones del estudio	45
6.3 Generalización	45
Capítulo 7. Conclusiones	46
Capítulo 8. Conflicto de intereses	46
Bibliografía	47
Anexo 1. Revisión sistemática de la literatura	52
A1.1 Objetivos de la revisión sistemática	52
A1.2 Metodología	52
A1.2.1 Criterios de inclusión y exclusión	52
A1.2.2 Palabras clave empleadas	52
A1.2.3 Localización de los estudios	53
A1.2.4 Estrategia de búsqueda	53
A1.2.5 Algoritmo de búsqueda	53
A1.2.6 Selección de los estudios localizados	54
A1.2.7 Evaluación de la calidad de los estudios	54
A1.2.8 Extracción de los datos de estudios individuales	54
A1.3 Resultados	55
A1.3.1 Artículos encontrados	55
A1.3.2 Características del estudio seleccionado	57
A1.3.3 Evaluación de la calidad de los estudios	64
A1.3.4 Limitaciones	65
A1.3.5 Generalizaciones	66
A1.4 Discusión y Conclusiones	66



Índice de tablas e ilustraciones

Tabla 1. Fenotipos de la EM	. 14
Tabla 2. Guías de práctica clínica para el tratamiento de pacientes con EMRR.	. 18
Tabla 3. Grupo terapéutico, especialidad y servicio de cladribina (Mavenclad®)	.20
Tabla 4. Dosis de Cladribina (Mavenclad®) por semana de tratamiento por peso)
de paciente	. 22
Tabla 5. Insumos disponibles para el tratamiento de pacientes con EMRR en el	
CByCMjError! Marcador no defini	do.
Tabla 6. Grupo terapéutico, especialidad y servicio de doxorubicina	. 24
Tabla 7. Grupo terapéutico, especialidad y servicio de epirubicina	. 25
Tabla 8. Propuesta de pregunta de investigación para la revisión sistemática de	·la
evidencia económica	. 26
Tabla 9. Principales características de la evidencia económica seleccionada	
(Lambe, y otros, 2018)	. 30
Tabla 10. Principales características de la evidencia económica seleccionada	
(Hettle, Harty, & Wong, 2018)	. 32
Tabla 11. Compradores seleccionados para la evaluación económica	. 35
Tabla 12. Efecto estimado de cladribina en comparación con las demás DMT	
evaluadas	. 35
Tabla 13. Costo de los fármacos	. 36
Tabla 14. Dosis de las opciones terapéuticas evaluadas	
Tabla 15. Número de tabletas/viales por paciente anual	. 37
Tabla 16. Costos utilizados para la administración y seguimiento del tratamiento	. 38
Tabla 17. Recursos utilizados para la administración de tratamiento	. 38
Tabla 18. Recursos utilizados para el monitoreo de tratamiento	. 38
Tabla 19. Análisis de sensibilidad determinístico univariado.	. 39
Tabla 20. Costo anual por paciente del tratamiento farmacológico	. 41
Tabla 21. Costo anual por paciente del monitoreo que requiere cada una de la	15
intervenciones	. 41
Tabla 22. Costo anual de monitoreo del fármaco, por paciente	. 41
Tabla 23. Resultados del análisis de minimización de costos	. 42
Tabla 24. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico univariado	. 43
Tabla 25. Pregunta de investigación para la revisión sistemática	. 52
Tabla 26. Ejemplo de la descripción del algoritmo de búsqueda	. 54
Tabla 27. Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática	. 57
Tabla 28. Efecto estimado de cladribina en comparación con las demás DMT	
evaluadas en la meta-regresión	. 58
Tabla 29. Resumen de perfil de seguridad	63



Ilustración 1. Algoritmo de PRISMA de los estudios seleccionados para la revisión
de evidencia económica2
Ilustración 2. Algoritmo de PRISMA*5
llustración 3. HR relativo a placebo para los comparadores por cada subgrupo de
pacientes para 6M-CDP5
Ilustración 4. RR relativo a placebo para los comparadores por cada subgrupo de
pacientes para ARR5
Ilustración 5. Resumen de eficacia entre cladribina vs otros tratamientos en tasa
anualizada de recaída6
llustración 6. Resumen de eficacia entre cladribina vs otros tratamientos en
progresión de la enfermedad confirmado por 6 meses a 24 meses
llustración 7. Tasa de tumores malignos en los grupos de tratamiento de los
estudios incluidos





Abreviaturas

Abreviatura	Significado
AVAC	Años de Vida Ajustados por Calidad
AVG	Años de vida ganados
СВуСМ	Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos
COFEPRIS	Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
DAT	Actividad de enfermedad en tratamiento
DMT	Terapia Modificadora de la Enfermedad
EM	Esclerosis Múltiple
EMA	European Medicines Agency
EMRR	Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente
FDA	Food and Drug Administration
HDA	Alta actividad de la enfermedad
HLA	Antígeno leucocitario humano
HRA	Actividad de recaídas alta
HR	Hazard Ratio
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
RMN	Resonancia magnética nuclear
SNC	Sistema Nervioso Central
TGF	Factor de Crecimiento Transformante
IC	Intervalo de Confianza
IFN	Interferón
NNT	Número Necesario a Tratar
OMS	Organización Mundial de la Salud
OR	Odds Ratio



Glosario de términos

Concepto	Definición
Criterios de inclusión	Normas médicas y éticas que determinan si una persona puede ingresar o no a un ensayo clínico.
Efectividad	Grado en el cual la intervención produce beneficios en una población definida en circunstancias reales no controladas.
Eficacia	Grado en el cual la intervención produce beneficios en poblaciones definidas en circunstancias controladas o ideales
Revisión sistemática	Estudio pormenorizado, selectivo y crítico que trata de analizar e integrar la información esencial de los estudios primarios de investigación sobre un problema de salud específico, en una perspectiva de síntesis unitaria de conjunto.



Resumen ejecutivo

Antecedentes

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica desmielinizante inflamatoria que involucra al sistema nervioso central (SNC). Se caracteriza por presentar inflamación patológica, desmielinización y daño axonal; los cuales conllevan a episodios clínicos de síntomas neurológicos (recurrencias) y un déficit del estado neurológico del paciente, asociado a una futura discapacidad (Comi, Hartung, Kurukulasuriya, Greenberg, & Scaramozza, 2013).

Existen distintas presentaciones de la enfermedad, sin embargo, la más común es la EM remitente recurrente (EMRR), la cual se caracteriza por que los pacientes presentan exacerbaciones de la enfermedad, denominados recurrencias, las cuales, cada vez que se presentan, impactan de manera considerable en la discapacidad del paciente. Entre los periodos de recurrencias, la progresión de la enfermedad es mínima (Olek & Howard, 2018).

Complementariamente a esta clasificación, también se ha propuesto la caracterización de la enfermedad de acuerdo con su actividad y progresión (Olek & Howard, 2018). Se puede caracterizar a un paciente con EMRR y con alta actividad de la enfermedad de acuerdo con los siguientes puntos:

- EMRR de rápida evolución, que haya presentado al menos 2 recaídas en el último año, y al menos una lesión T1 identificada con resonancia magnética nuclear (RMN) mejorada con gadolinio (NICE, 2017).
- EMRR con respuesta inadecuada a una terapia modificadora de la enfermedad (DMT, por sus siglas en inglés), definida por la presencia de una recaída en el último año, y evidencia de actividad de la enfermedad por medio de RMN (NICE, 2017).

De acuerdo con las recomendaciones de las guías de práctica clínica, se recomienda ofrecer tratamiento temprano con DMT a pacientes con RRMS con alta actividad de la enfermedad según lo definido por el número de recaídas clínicas y/ o actividad detectada por MRI. En pacientes con EMRR con alta actividad de la enfermedad, se recomienda el uso de los siguientes tratamientos: $IFN\beta-1b$, $IFN\beta-1a$, PEG $IFN\beta-1a$, acetato de glatiramer, teriflunomida, dimetilfumarato, cladribina, fingolimod, daclizumab, natalizumab, ocrelizumab y alemtuzumab.



Objetivo

Demostrar que el uso de cladribina (Mavenclad®), es una alternativa costoahorradora en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad comparada con fingolimod y natalizumab desde la perspectiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Metodología

Se realizó un análisis de minimización de costos basado en los resultados del estudio (Siddiqui, y otros, 2018) donde se demostró que el uso de cladribina (MAVENCLAD®) en comparación con fingolimod y natalizumab en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad posee una eficacia similar considerando como medida de resultados la tasa anualizada de recaídas. Asimismo el horizonte temporal considerado para el análisis fue de 4 años con el fin de representar la historia natural de la enfermedad tomando en cuenta únicamente los costos médicos directos asociados a cada alternativa evaluada, los cuales fueron: el costo de los fármacos, costo de administración del tratamiento y costo de monitoreo, estos costos, fueron descontados al 5%, por último se realizó un análisis de sensibilidad determinístico univariado con el fin de permear la incertidumbre del análisis.

Resultados

El análisis de minimización de costos donde se consideraron los costos médicos directos asociados a cada intervención (costo de adquisición de fármacos, costo de administración y monitoreo) demostró que el uso de cladribina (MVENCLAD®) tienen un costo total descontado por paciente a 4 años de \$109,389.64 mientras que fingolimod y natalizumab tienen un costo total descontado por paciente a 4 años de \$139,127.47 y \$162,222.59, respectivamente. Lo que se traduce en un ahorro de \$29,737.83 comparado con fingolimod y \$52,832.95 comparado con natalizumab en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad, siendo así Cladribina (MAVENCLAD®) una alternativa costo ahorradora.

Conclusiones

La evidencia clínica presentada en el presente análisis demostró que el uso de cladribina (MAVENCLAD®) en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad en comparación con fingolimod y natalizumab posee eficacia similar considerando como medida de resultados la tasa anualizada de recaídas, además se demostró en la presente



evaluación económica que cladribina (MAVENCLAD®) es una opción costoahorradora desde la perspectiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Asimismo, es una alternativa que atiende una demanda insatisfecha simplificando el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad.

Por último, se demostró en el análisis de sensibilidad determinístico univariado que el modelo es robusto ante condiciones de incertidumbre ya que al modificar las variables más relevantes del análisis estas no se modificaron de manera sustancial respecto al caso base.



Capítulo 1

- 1.1 Descripción de los temas abordados en el reporte Este documento contiene la evaluación económica de cladribina (Mavenclad®) indicado en el tratamiento de pacientes con EMRR.
- 1.2 Declaración de la pregunta de investigación. ¿El uso cladribina (Mavenclad®) es una opción costo-ahorradora comparado con natalizumab y fingolimod desde la perspectiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social?
- 1.3 Objetivo general del estudio

Demostrar que el uso de cladribina (Mavenclad®), es una alternativa costoahorradora en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad con fingolimod y natalizumab desde la perspectiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.



Capítulo 2

2.1 Introducción

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica desmielinizante inflamatoria que involucra al sistema nervioso central (SNC). Se caracteriza por presentar inflamación patológica, desmielinización y daño axonal; los cuales conllevan a episodios clínicos de síntomas neurológicos (recurrencias) y un déficit del estado neurológico del paciente, asociado a una futura discapacidad (Comi, Hartung, Kurukulasuriya, Greenberg, & Scaramozza, 2013).

La EM se puede presentar en distintas formas, las cuales se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Fenotipos de la EM.

Fenotipo	Características
	Es el primer episodio que sugiere la presencia de EM. Se puede caracterizar por las siguientes características:
SCA	 Los hallazgos indican un evento desmielinizante inflamatorio focal o multifocal en el SNC.
	 Se desarrolla de manera aguda, con una duración aproximada de 24 horas.
	 Ocurre en la ausencia de fiebre o infección. Se asemeja a una recurrencia (ataque o exacerbación).
EMRR	Los pacientes presentan exacerbaciones de la enfermedad, denominados recurrencias, las cuales, cada vez que se presentan, impactan de manera considerable en la discapacidad del paciente. Entre los periodos de recurrencias, la progresión de la enfermedad será mínima.
EMSP	Es una fase posterior a la EMRR, donde la enfermedad empeoró gradualmente. El paso de EMRR a EMSP ocurre generalmente de 10 a 20 años posterior al diagnóstico.
EMPP	Se caracteriza por una acumulación progresiva de discapacidad desde el inicio de la enfermedad con mejorías mínimas y temporales. De igual manera que la EMSP, no existe un diagnóstico certero para la clasificación de los pacientes, más, la clasificación se logra por medio de la evaluación
	de la historia clínica del paciente.

EMPP: Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva; EMRR: Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente; EMSP: Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva; SCA: Síndrome clínico aislado.

Fuente: (Olek & Howard, 2018)

Complementariamente a esta clasificación, también se ha propuesto la caracterización de la enfermedad de acuerdo con su actividad y progresión (Olek



& Howard, 2018). Se puede caracterizar a un paciente con EMRR y con alta actividad de la enfermedad de acuerdo con los siguientes puntos:

- EMRR de rápida evolución, que haya presentado al menos 2 recaídas en el último año, y al menos una lesión T1 identificada con resonancia magnética nuclear (RMN) mejorada con gadolinio (NICE, 2017).
- EMRR con respuesta inadecuada a una terapia modificadora de la enfermedad (DMT, por sus siglas en inglés), definida por la presencia de una recaída en el último año, y evidencia de actividad de la enfermedad por medio de RMN (NICE, 2017).

2.1.1 Etiología

Actualmente, la etiología de la EM sigue siendo desconocida, sin embargo, existe evidencia suficiente para asociar factores genéticos, principalmente, al desarrollo de la enfermedad (Huang, Chen, & Zhang, 2017).

Principalmente se ha asociado la presencia de polimorfismos en la región del antígeno leucocitario humano (HLA, por sus siglas en inglés), localizado en el cromosoma 6, con el desarrollo de EM. Esta asociación surge a partir de que esta región del genoma contiene aproximadamente 250 genes que juegan un papel importante en el sistema inmunológico. La importancia de esta región fue confirmada en un estudio, con un Odds Ratio (OR) de 11.66 (Goris, Dubois, & Hilven, 2016).

2.1.2 Fisiopatología

La fisiopatología de la enfermedad es compleja y actualmente se conoce poco. La característica más común en estos pacientes es la presencia de daño focal que indica pérdida de mielina en el cerebro y la medula espinal, los cuales se definen como placas o lesiones (Popescu, Pirko, & Lucchinetti, 2013). Estas lesiones suelen estar acompañadas de inflamación, desmielinización, daño axonal y pérdida de axones (Huang, Chen, & Zhang, 2017).

Uno de los mecanismos propuestos para explicar el proceso de inflamación en la esclerosis múltiple indica que este se lleva a cabo por medio de un proceso autoinmune, donde la infiltración, a través de la barrera hematoencefálica, de linfocitos T CD4+ diferenciados en linfocitos T "helpers" (Th) Th1, los cuales liberan citosinas pro-inflamatorias, interferón gamma (IFNy), IFN tipo II, o Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNFa). Th2 libera citosinas pro-inflamatorias, interleucina 4 (IL-4), e IL-3. Por otra parte, los linfocitos Th17 inducen la liberación de IL-17, IL-21, IL-22, e IL-26,



promoviendo el proceso inflamatorio (Ghasemi, Razavi, & Nikzad, 2017) (Wu & Alvarez, 2011) (Loma & Heyman, 2011).

Por su parte, los linfocitos B pueden contribuir a la patogénesis de la enfermedad por medio de la liberación de Factor de Crecimiento Transformante beta (TGF-β) y TNFa, los cuales contribuyen al proceso inflamatorio (Ghasemi, Razavi, & Nikzad, 2017).

La formación de las placas, gracias a las distintas vías de liberación de agentes proinflamatorios, puede ser localizado a lo largo del SNC, principalmente en los nervios ópticos, médula espinal, tronco encefálico, cerebelo, sustancia blanca yuxtacortical y periventricular, así como en el cuerpo calloso (Olek & Mowry, 2018).

2.1.3 Factores de riesgo

Uno de los factores de riesgo más estudiados es la predisposición genética. En las personas con algún familiar con EM en primer grado, el riesgo de presentar la enfermedad aumenta entre 10 y 25 veces que en la población general (Ramagopalan, Dobson, Meier, & Giovannoni, 2010).

Complementariamente, se han identificado algunos factores ambientales que de igual manera, se han asociado con el desarrollo de EM, como por ejemplo:

- **Latitud**. La incidencia de EM es alta en algunas regiones específicas, sin embargo, esta distribución geográfica puede ser explicada por medio de factores genéticos y étnicos.
- **Vitamina D**. Se ha observado una relación entre la exposición a luz solar y el estatus asociado de vitamina D con la incidencia de EM, siendo esta relación inversamente proporcional.
- Infección por el virus Epstein-Barr. Se estima que el 99% de los pacientes con EM presentaron infección por el virus de Epstein-Barr.

2.1.4 Diagnóstico

El principal indicador de la presencia de EM se da por medio de un conjunto de síntomas que sugieren un proceso desmielinizante focal o multifocal en el SNC. El principal grupo poblacional afectado son adultos jóvenes. Los síntomas más comunes que se presentan incluyen neuritis óptica, signo de Lhermitte, oftalmoplegia internuclear, fatiga y sensibilidad al calor. Para confirmar el diagnóstico de EM, es necesario realizar una RMN, mediante la cual se observará la presencia de lesiones en el SNC (Olek, H, & J, Evaluation and diagnosis of multiple sclerosis in adults, 2018).



2.1.5 Epidemiología

En países como EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda, Australia y el norte de Europa, la incidencia de EM es alta, en comparación con países latinoamericanos, llegando hasta a 196 por cada 100,000 habitantes (Aguirre, Flores, De la Cruz, Rangel, & Corona, 2011).

De acuerdo con una revisión sistemática de estudios epidemiológicos de EM en Latino América, se estimó que la incidencia se encuentra en un rango entre 0.3 y 3 casos anuales por cada 100,000 personas-año. Por otro lado, la prevalencia se estimó en un rango que comprende 0.82 a 38.2 casos por cada 100,000 habitantes. Esta información fue obtenida a partir de estudios epidemiológicos de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina (Cristiano & Ignacio, 2017).

2.1.6 Carga de enfermedad

La EM no es una enfermedad fatal, de hecho, la esperanza de vida de los pacientes con EM, en comparación con pacientes sanos, difiere por algunos meses (Rolak, 2003). Sin embargo, el verdadero impacto de la EM radica en la discapacidad que ejerce sobre los pacientes.

Los síntomas presentados en el curso de la enfermedad afectarán de manera directa la percepción del paciente con respecto a su calidad de vida. Algunos de los síntomas que presentan mayor impacto en la calidad de vida del paciente incluyen: problemas de la marcha, problemas de equilibrio, tremor, vértigo, espasticidad, fatiga y depresión (Barin, y otros, 2018) (Isaksson, Ahlström, & Gunnarsson, 2005) (Göksel, y otros, 2011).

2.2 Recomendaciones de guías de práctica clínica

Las recomendaciones de las guías de práctica clínica para el tratamiento de pacientes con EMRR.



Tabla 2. Guías de práctica clínica para el tratamiento de pacientes con EMRR.

Guía	Recomendaciones
	GPC Internacionales
European Committee of Treatment and Research in	 Se recomienda ofrecer DMT únicamente en centros de salud que cuenten con la infraestructura suficiente para proveer un monitoreo adecuado al paciente.
Multiple Sclerosis / European Academy of Neurology ECTRIMS/EAN Guideline on the pharmacological	 Ofrecer tratamiento temprano con DMT a pacientes con RRMS con alta actividad de la enfermedad según lo definido por el número de recaídas clínicas y/ o actividad detectada por MRI.
treatment of people with multiple sclerosis Europa, 2018 (Montalban, y otros, 2018)	• En pacientes con EMRR con alta actividad de la enfermedad, se recomienda el uso de los siguientes tratamientos: IFN β -1b, IFN β 1a, PEG IFN β -1a, acetato de glatiramer, teriflunomida, dimetilfumarato, cladribina, fingolimod, daclizumab, natalizumab, ocrelizumab y alemtuzumab.
(Mornaldari, y Orros, 2010)	 La selección del tratamiento dependerá de las características y comorbilidades del paciente, severidad o actividad de la enfermedad, perfil de seguridad del fármaco y accesibilidad del medicamento.
American Academy of Neurology	 Debido a la gran variedad de DMT, es recomendable evaluar las preferencias del paciente para lograr aceptación y mayor adherencia al tratamiento.
Practice guideline: Disease- modifying therapies for adults with multiple sclerosis	 Se recomienda prescribir un DMT a personas que hayan sufrido un evento clínico desmielinizante y que presenten 2 o más lesiones cerebrales consistentes con EM.
EE.UU., 2017	 Se recomienda emplear alemtuzumab, fingolimod o natalizumab para personas con EM con alta actividad de la enfermedad.
(AAN, 2018)	 Se recomienda emplear azatioprina o cladribina para las personas con EMRR que no tienen acceso a DMT aprobados.
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health Recommendations for Drug	• Se recomienda empelar acetato de glatiramer o IFN β -1b como tratamiento de primera línea en pacientes con EMRR.
Therapies for Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Canada, 2013	• En los pacientes con EMRR que no respondan, o que tengan contraindicado el uso de acetato de glatiramer como tratamiento inicial, se debe emplear IFN β -1b.



Gυία	Recomendaciones
(CADTH, 2013)	 En los pacientes con EMRR que no respondan, o que tengan contraindicado el uso de IFN β-1b como tratamiento inicial, se debe emplear acetato de glatiramer.
	 Como tratamiento de segunda se recomienda emplear una de las siguientes alternativas: dimetilfumarato, fingolimod y natalizumab.
	 No se recomienda emplear terapia combinada para el tratamiento de EMRR.
	GPC Nacionales
	Se sugiere empezar con un tratamiento de primera línea con alguno de los siguientes medicamentos:
Revista Mexicana de Neurociencia	 IFN β-1b ο IFN β-1a Acetato de glatiramer Fingolimod Natalizumab (en casos agresivos) Azatioprina Teriflunomida
Esclerosis múltiple: situación actual y tendencias futuras México, 2016 (Fernández, y otros, 2016)	 En caso de falla terapéutica se puede optar por aumentar la dosis de IFN β, o acetato de glatiramer, de acuerdo a cual haya sido el tratamiento inicial. En caso de que la primera línea haya fallado, se recomienda cambiar a tratamientos de segunda línea, los cuales incluyen natalizumab o mitoxantrona.
	En caso de que el paciente presente fallo a natalizumab se recomienda emplear las siguientes alternativas: rituximab, alemtuzumab, ciclofosfamida o trasplante de médula ósea.
Secretaría de Salud Tratamiento modificador de enfermedad en pacientes con diagnóstico de esclerosis	 En pacientes tratados con IFN β (1a/1b) y falla a tratamiento y anticuerpos negativos se valorará el cambio a otro interferón con mayor dosis/frecuencia. En los casos con anticuerpos positivos o imposibilidad para realizarse se valorará el cambio a acetato de glatiramer.
múltiple. México, 2010 (SSA, 2010)	 En los casos de falla a tratamiento y/o enfermedad rápidamente progresiva con un componente inflamatorio importante se debe utilizar natalizumab como terapia inicial.



Guía	Recomendaciones
	 En casos particulares y no disposición de terapias de segunda línea se podrá utilizar ciclofosfamida o azatioprina.

Fuente: Elaboración propia

2.3 Descripción de la tecnología

2.3.1 Cladribina (Mavenclad®)

2.3.1.1 Principio activo, mecanismo de acción y farmacocinética

Cladribina (Mavenclad®) es un análogo a purina que imita al nucleósido adenosina. Este es fosforilado a 2-cloro-2´desoxi-beta-D-adenosina monofosfato, el cual es resistente a desaminación. Debido a que existen pocas desaminasas en linfocitos y monocitos, este metabolito se acumula de manera intracelular, para posteriormente ser modificado a su forma trifosfatada, llevando a muerte celular (Holmøy, Torkildsen, & Myhr, 2017).

Las células con niveles altos de desoxinucleótidos son incapaces de reparar rupturas en la cadena de DNA, lo que conlleva a daño del DNA y muerte celular. Cladribina (Mavenclad®) induce una disminución rápida y prolongada de linfocitos B y CD4+ (Holmøy, Torkildsen, & Myhr, 2017).

En cuanto a sus características farmacocinéticas, la biodisponibilidad de cladribina (Mavenclad®) al ser administrada vía oral es de 37 a 51%. Su biodisponibilidad se ve modificada al ser administrada en conjunto con alimentos, aumentando en 5%. La vida media del fármaco es de 5.7 a 19.4 horas, con un volumen de distribución entre 54 y 357 L/m². Su unión a proteínas es de 20%. Su principal metabolito es 2-cloroadenina. Su eliminación es principalmente renal (Holmøy, Torkildsen, & Myhr, 2017).

2.3.1.2 Grupo terapéutico, especialidad y servicio

En la siguiente tabla se muestran las características de cladribina (Mavenclad®).

Tabla 3. Grupo terapéutico, especialidad y servicio de cladribina (Mavenclad®).

Descripción de uso de formulaciones de cladribina (Mavenclad®).			
	L – Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores		
Grupo terapéutico	L01 – Agentes antineoplásicos		
(WHO, 2017)	L01B – Antimetabolitos		
	L01BB – Análogos de purina		



	L01BB04 - Cladribina
Especialidad	Neurología
Servicio	Neurología

Fuente: Elaboración propia

2.3.1.3 Indicación terapéutica

Cladribina (MAVENCLAD®) está indicado en el tratamiento de EMRR para reducir la frecuencia de recurrencias y retrasar la progresión de la discapacidad física. Después de completar 2 cursos de tratamiento, no se requiere más tratamiento con cladribina en los años 3 y 4. El re-inicio de la terapia después del cuarto año no se ha evaluado.

2.3.1.4 Estado de regulación

Cladribina (Mavenclad®) cuenta con el número de registro sanitario PF-56398-2019.

La "European Medicines Agency" (EMA) aprobó la comercialización de cladribina (Mavenclad®) desde 08/09/2017 (EMA, 2017).

2.3.1.5 Grupo de pacientes en los que se desea utilizar

Pacientes adultos con EMRR con enfermedad con alta enfermedad de la actividad.

2.3.1.6 Ventajas y desventajas del insumo propuesto

La vía de administración de cladribina (Mavenclad®) es por vía oral, lo cual evita que el paciente deba estar hospitalizado para la administración de su tratamiento, como ocurre en tratamientos intravenosos (Comi, Hartung, Kurukulasuriya, Greenberg, & Scaramozza, 2013).

El esquema de tratamiento de cladribina (Mavenclad®) disminuye el número de administraciones del medicamento, lo cual aumenta la adherencia al mismo. En otras publicaciones se ha demostrado que la falta de adherencia en tratamientos indicados para enfermedades crónicas es un problema mayor, ya que el resultado de poca adherencia reduce la efectividad del tratamiento e incrementa los costos asociados con salud (AAN, 2018).

Otra ventaja del esquema terapéutico de cladribina (Mavenclad®), radica en que el tratamiento debe ser administrado durante dos años, y los dos años posteriores a estos no se administra cladribina (Mavenclad®), ya que se ha demostrado que su eficacia se mantiene durante este tiempo (Giovannoni, y otros, Safety and efficacy of cladribine tablets in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: Results from the randomized extension trial of the CLARITY study., 2018).



Se ha publicado evidencia que indica que cladribina (Mavenclad®) es especialmente eficaz en pacientes con EMRR con alta actividad de la enfermedad, disminuyendo significativamente la progresión de la enfermedad en estos pacientes, en comparación con pacientes que no presentan alta actividad de la enfermedad (Giovannoni, y otros, 2018).

Cladribina (Mavenclad®) cuenta con un perfil de seguridad similar al de otras alternativas terapéuticas (Siddiqui, y otros, 2018) (Pakpoor, y otros, 2015).

2.3.1.7 Duración de la aplicación de la intervención, vía de administración, dosis y tipo de dispensación

Se recomienda que la dosis acumulada de cladribina (Mavenclad®) sea de 3.5mg/Kg de peso durante 2 años, administrados en un curso de tratamiento de 1.75 mg/Kg por año. Cada curso de tratamiento consiste en 2 semanas de tratamiento, uno al inicio del primer mes y otro al inicio del segundo mes. Cada semana de tratamiento consiste en 4 o 5 días, durante los cuales el paciente recibirá 10mg o 20mg (una o dos tabletas) como una sola dosis diaria, dependiendo del peso corporal del paciente (Tabla 4). Al terminar los dos cursos de tratamiento no es necesario continuar la administración de Cladribina (Mavenclad®) durante los años 3 y 4.

Tabla 4. Dosis de Cladribina (Mavenclad®) por semana de tratamiento por peso de paciente.

Rango de peso (Kg)	Dosis en mg (número de tabletas de 10mg) por semana de tratamiento		
	Tratamiento en semana 1	Tratamiento en semana 2	
40 a <50	40 mg (4 tabletas)	40 mg (4 tabletas)	
50 a <60	50 mg (5 tabletas)	50 mg (5 tabletas)	
60 a <70	60 mg (6 tabletas)	60 mg (6 tabletas)	
70 a <80	70 mg (7 tabletas)	70 mg (7 tabletas)	
80 a <90	80 mg (8 tabletas)	70 mg (7 tabletas)	
90 a <100	90 mg (9 tabletas)	80 mg (8 tabletas)	
100 a <110	100 mg (10 tabletas)	90 mg (9 tabletas)	
>110	100 mg (10 tabletas)	100 mg (10 tabletas)	

Fuente: PENDIENTE

2.3.1.8 Tipo de instalaciones y capacitación de personal que se requiere para el uso adecuado del insumo

Cladribina (Mavenclad®) se administra vía oral, las cuales son administradas por el mismo paciente, de manera ambulatoria. Las tabletas de cladribina (Mavenclad®) se administran vía oral. Se recomienda ingerir la tableta con agua. Esta tableta no debe ser masticada ni debe disolverse en la boca. El contacto con la piel debe ser



limitado. El paciente debe evitar tocar nariz, ojos u otras partes del cuerpo posterior a la manipulación de la tableta.

2.4.1 Comparadores

Como se comentó anteriormente, Cladribina (Mavenclad®) está aprobado por la EMA en pacientes con EMRR con alta actividad de la enfermedad. De acuerdo con un comunicado de NICE, los pacientes con alta actividad de la enfermedad se definen como:

- EMRR de rápida evolución, que haya presentado al menos 2 recaídas en el último año, y al menos una lesión T1 identificada con RMN mejorada con gadolinio (NICE, 2017).
- EMRR con respuesta inadecuada a una DMT, definida por la presencia de una recaída en el último año, y evidencia de actividad de la enfermedad por medio de RMN (NICE, 2017).

De acuerdo a guías de práctica clínica y a consensos de expertos, se recomienda que aquellos pacientes que presenten EMRR con alta actividad de la efermedad sean tratados con DMT de alta eficacia, como lo son fingolimod y natalizumab (Alroughani, y otros, 2019) (Scolding, y otros, 2015).

2.4.2 Fingolimod

2.4.2.1 Principio activo, mecanismo de acción y farmacocinética

Fingolimod es un modulador de los receptores de la esfingosina-1-fosfato. La enzima esfingosina-cinasa lo metaboliza y convierte en el metabolito activo fosfato de fingolimod, el cual se une a receptores de esfingosina (\$1P) 1, 3 y 4, localizados en linfocitos. Además, es capaz de atravesar la barrera hematoencefalica, lo que le permite unirse a receptores \$1P1, 3 y 5 de células neurales del \$NC. Su unión al receptor \$1P bloquea la capacidad de que los linfocitos puedan egresar de ganglios linfáticos, causando una redistribución de estas células, reduciendo así su infiltración al \$NC (PLM, 2018).

Fingolimod se absorbe de manera lenta, presentando un tiempo de absorción máximo de 12 a 16 horas. La biodisponibilidad del fármaco es de hasta 93%. La ingesta de alimentos no modifica su absorción. Su distribución es amplia, y la fracción asociada a células sanguíneas alcanza el 86%. La unión a proteínas es >99.7%. Su biotransformación da paso a la generación de su metabolito activo, el fingolimod fosfato. La vida media de eliminación es de 6 a 9 días. Su excreción es principalmente por vía renal (81%) (PLM, 2018).

2.4.2.2 Grupo terapéutico, especialidad y servicio

En la siguiente tabla se muestran las características de doxorubicina.



Tabla 5. Grupo terapéutico, especialidad y servicio de doxorubicina.

Descripción de uso de formulaciones de doxorubicina.		
Grupo terapéutico (WHO, 2017)	L – Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores	
	L04 – Inmunosupresores	
	L04A – Inmunosupresores	
	L04AA- Inmunosupresores selectivos	
	L04AA - Fingolimod	
Especialidad	Neurología	
Servicio	Neurología	

Fuente: Elaboración propia

2.4.2.3 Indicación terapéutica

Fingolimod está indicado como DMT para reducir la frecuencia de las recaídas y retrasar la progresión de la discapacidad en los pacientes con EMRR (PLM, 2018).

2.4.2.4 Contraindicaciones

Fingolimod no debe ser empleado durante el embarazo ni en la lactancia. No debe ser administrado a menores de 18 años, o en pacientes con hipersensibilidad conocida a fingolimod o a cualquiera de los componentes de la fórmula (PLM, 2018).

También se encuentra contraindicado en pacientes con problemas de corazón, problemas cerebrovasculares, apoplejías prexistentes o recientes (6 meses) o aquellos que toman antiarrítmicos (PLM, 2018). Ocasión

2.4.2.5 Estado de regulación

Fingolimod cuenta con el registro sanitario número: 105M2011, SSA IV (PLM, 2018).

2.4.3 Natalizumab

2.4.3.1 Principio activo, mecanismo de acción y farmacocinética

Natalizumab es un inhibidor selectivo de las moléculas de adhesión y se une a la subunidad alfa 4 de las integrinas humanas, altamente expresada en la superficie de todos los leucocitos. Natalizumab bloquea la interacción de la integrina alfa 4, beta 7 con la molécula de adhesión celular de adresina mucosal 1 (MadCAM 1). La alteración de estas interacciones moleculares evita la migración de los leucocitos mononucleares a través del endotelio hacia el tejido parenquimatoso inflamado (PLM, 2018).



En cuanto a sus características farmacocinéticas, natalizumab es administrado vía intravenosa, logrando una concentración sérica máxima de 110 µg/mL, tras la administración repetida de 300mg de natalizumab. El aclaramiento de natalizumab en estado de equilibrio fue de 13.1 mL/h, con una semivida de 16 días (PLM, 2018).

2.4.3.2 Grupo terapéutico, especialidad y servicio

En la siguiente tabla se muestran las características de epirubicina.

Tabla 6. Grupo terapéutico, especialidad y servicio de epirubicina.

Descripción de uso de formulaciones de epirubicina.			
Grupo terapéutico (WHO, 2017)	L – Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores		
	L04 – Inmunosupresores		
	LO4A – Inmunosupresores		
	L04AA – Inmunosupresores selectivos		
	L04AA23 - Natalizumab		
Especialidad Neurología			
Servicio	Neurología		

Fuente: Elaboración propia

2.4.3.3 Indicación terapéutica

Natalizumab está indicado como tratamiento modificador de la enfermedad en monoterapia en la esclerosis múltiple remitente recidivante muy activa (PLM, 2018).

2.4.3.4 Contraindicaciones

Natalizumab está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a natalizumab o a alguno de sus excipientes. También se encuentra contraindicado en pacientes que presenten leucoencefalopatía multifocal progresiva, pacientes inmunodeprimidos, neoplasias malignas activas conocidas, y en niños y adolescentes (PLM, 2018).

2.4.3.5 Estado de regulación

Natalizumab cuenta con el registro sanitario número: 133300EL870012 (PLM, 2018).



Capítulo 3. Revisión de la evidencia económica

3.1 Objetivo

Realizar una revisión sistemática de la evidencia económica del uso de cladribina (MAVENCLAD®) en comparación con fingolimod y natalizumab en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad.

Tabla 7. Propuesta de pregunta de investigación para la revisión sistemática de la evidencia económica.

	Pregunta PICO			
Población	Pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad			
Intervención	Cladribina (MAVENCLAD®)			
Comparador	Fingolimod			
	Natalizumab			
Resultados	Costos totales			
	Razón Costo Efectividad Incremental (RCEI)			
Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC)				
	Años de Vida Ganados (AVG)			

Fuente: Elaboración propia

3.2 Metodología

Se realizó una búsqueda de la evidencia económica en las bases de datos PubMed, Cochrane Library, CRD York y Value in Health; y se identificaron los estudios que fueran relevantes para la revisión y que cumplieran con los criterios de inclusión siguientes:

- a. Artículos de estudios primarios provenientes de revistas de circulación periódica.
- b. Publicados en revistas nacionales o extranjeras en español e inglés.
- c. Publicados en la última década.
- d. Evaluaciones económicas que evalúen el perfil de costo-efectividad, costoutilidad, o costo-beneficio de uso de cladribina (MAVENCLAD®) en comparación con fingolimod y natalizumab en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad.



Los títulos y resúmenes de las citas recuperadas fueron seleccionados con base en los criterios de inclusión definidos.

En cada paso de la revisión participaron dos revisores independientes y cualquier discrepancia se reconcilió por el tercer revisor independiente.

3.3 Estrategias de búsqueda

A continuación, se muestran los algoritmos de búsqueda utilizados para la base de datos PubMed los cuales también fueron adaptados para el resto de las bases de datos:

(("multiple sclerosis"[MeSH Terms] OR ("multiple"[All Fields] AND "sclerosis"[All Fields]) OR "multiple sclerosis" [All Fields]) AND ("cladribine" [MeSH Terms] OR "cladribine" [All Fields]) AND ("fingolimod hydrochloride"[MeSH Terms] OR ("fingolimod"[All Fields] AND "hydrochloride"[All Fields]) OR "fingolimod hydrochloride"[All Fields] OR "fingolimod"[All Fields]) AND ("natalizumab"[MeSH Terms] OR "natalizumab"[All Fields])) AND (("cost-benefit analysis"[MeSH Terms] OR ("cost-benefit"[All Fields] AND "analysis"[All Fields]) OR "cost-benefit analysis"[All Fields] OR ("economic"[All Fields] AND "evaluation" [All Fields]) OR "economic evaluation" [All Fields]) OR ("cost-benefit analysis"[MeSH Terms] OR ("cost-benefit"[All Fields] AND "analysis"[All Fields]) OR "cost-benefit analysis"[All Fields] OR ("cost"[All Fields] AND "benefit"[All Fields]) OR "cost benefit"[All Fields]) OR ("economics"[Subheading] OR "economics"[All Fields] OR "cost" [All Fields] OR "costs and cost analysis" [MeSH Terms] OR ("costs" [All Fields] AND "cost" [All Fields] AND "analysis" [All Fields]) OR "costs and cost analysis" [All Fields]) OR ("cost-benefit analysis"[MeSH Terms] OR ("cost-benefit"[All Fields] AND "analysis"[All Fields]) OR "cost-benefit analysis"[All Fields] OR ("cost"[All Fields] AND effectiveness"[All "effectiveness"[All Fields1) OR "cost Fields1) (("economics" [Subheading] OR "economics" [All Fields] OR "cost" [All Fields] OR "costs and cost analysis"[MeSH Terms] OR ("costs"[All Fields] AND "cost"[All Fields] AND "analysis"[All Fields]) OR "costs and cost analysis"[All Fields]) AND utility[All Fields]))

("cladribine"[MeSH Terms] OR "cladribine"[All Fields]) AND HDA[All Fields]) AND (("cost-benefit analysis"[MeSH Terms] OR ("cost-benefit"[All Fields] AND "analysis"[All Fields]) OR "cost-benefit analysis"[All Fields] OR ("economic"[All Fields] AND "evaluation"[All Fields]) OR "economic evaluation"[All Fields]) OR ("cost-benefit analysis"[MeSH Terms] OR ("cost-benefit"[All Fields] AND "analysis"[All Fields]) OR "cost-benefit analysis"[All Fields] OR ("cost"[All Fields] AND "benefit"[All Fields]) OR "cost benefit"[All Fields]) OR ("cost-benefit analysis"[MeSH Terms] OR ("cost-benefit analysis"[All Fields]) OR "cost-benefit analysis"[All Fields]) OR ("cost"[All Fields]) OR "cost effectiveness"[All Fields]) OR ("costs and cost analysis"[MeSH Terms] OR ("costs"[All Fields]) AND "cost"[All Fields] AND "cost"[All Fields] OR ("cost"[All Fields]) OR "cost analysis"[All Fields]) OR ("cost"[All Fields])



OR "economics" [All Fields] OR "cost" [All Fields] OR "costs and cost analysis" [MeSH Terms] OR ("costs" [All Fields] AND "cost" [All Fields] AND "analysis" [All Fields]) OR "costs and cost analysis" [All Fields]) OR ("costs and cost analysis" [MeSH Terms] OR ("costs" [All Fields] AND "cost" [All Fields] AND "analysis" [All Fields]) OR "costs and cost analysis" [All Fields] OR "costs" [All Fields]))

3.4 Características de los estudios


Se encontraron un **total de 17** artículos en la búsqueda de información realizada; **2 en PubMed, 5 en The Cochrane Library ,7 en Value en Health Y 3 en CRD York** (Ver llustración 1), los cuales fueron analizados. De estos 17 estudios analizados:

Se descartaron 8 artículos por no ser evaluaciones económicas.

Se excluyeron 9 artículos por evaluar a poblaciones e intervenciones distintas a las analizadas o ser solo resumen (abstract). Finalmente se seleccionaron 2 artículos los cuales cumplen con todos los criterios de inclusión establecidos.



Ilustración 1. Algoritmo de PRISMA de los estudios seleccionados para la revisión de evidencia económica.



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el análisis de los estudios seleccionados



Tabla 8. Principales características de la evidencia económica seleccionada (Lambe, y otros, 2018)

	OTFOS, 2018)
Autor	(Lambe, y otros, 2018)
Título	Cladribine Tablets for the First-Line Treatment of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: An Evidence Review Group Perspective of a NICE Single Technology Appraisal
Tipo de Evaluación Económica	Evaluación de tecnología
País	Inglaterra
Perspectiva	Perspectiva del sistema nacional de salud
Metodología	Como parte del proceso de evaluación de una sola tecnología, el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención (NICE) invitó a Merck a presentar pruebas de la eficacia clínica y económica de los comprimidos de cladribina para el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR). El Instituto Nacional para la Excelencia en la Atención de la Salud especificó como subgrupos de interés las RRMS de evolución grave (RES) y de tratamiento subóptimamente (SOT) que evolucionan rápidamente. El Grupo de Revisión e Implementación de Liverpool en la Universidad de Liverpool fue el Grupo de Revisión de Evidencia. Este artículo resume la revisión del Grupo de Revisión de Evidencia de la presentación de evidencia de la compañía para cladribina y la decisión final del Comité de Evaluación. El alcance final emitido por el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención incluyó los siguientes tratamientos modificadores de la enfermedad como comparadores: alemtuzumab, daclizumab, fingolimod y natalizumab. En el momento de la presentación de la empresa, se anticipó una licencia para la dosis baja de cladribina. La principal evidencia clínica (el ensayo CLARITY) en la presentación de la compañía se centró en la eficacia de la dosis baja de cladribina versus placebo. El ensayo CLARITY mostró una reducción estadísticamente significativa en la tasa de recaída de cladribina en el subgrupo RES-RRMS (n = 50) pero no en el subgrupo SOT-RRMS (n = 19). La cladribina mostró una ventaja numérica, pero no estadísticamente significativa, para retrasar la progresión de la discapacidad a los 6 meses en el subgrupo RES-RRMS. Los beneficios de la progresión de la discapacidad no se pudieron estimar para aquellos en el subgrupo SOT-RRMS debido a pocos eventos. La principal preocupación del Grupo de Revisión con respecto a la evidencia clínica fue el tamaño pequeño de la muestra de los subgrupos. Para comparar la efectividad de la cladribina con otros tratamientos modificadores de la enfermedad. La compañía realizó metaráli
	enfermedad, la compañía realizó metanálisis de red, que mostraron que cladribina y sus comparadores son igualmente efectivos. El Grupo de Revisión de Evidencia consideró que los resultados de los tratamientos modificadores de la enfermedad no eran confiables porque había pocos ensayos en la red. La evidencia de costo-efectividad de la compañía mostró que la cladribina es más barata y más efectiva que otros tratamientos modificadores de la enfermedad



	en el brazo RES-RRMS y el brazo SOT-RRMS. Los resultados fueron más sensibles al efecto del tratamiento sobre la progresión de la discapacidad a los 6 meses.			
	Al Grupo de Revisión de Evidencia le preocupaba que no hubiera pruebas suficientes para concluir que cladribina fue superior al placebo para retrasar la progresión de la discapacidad. El Grupo de Revisión de Evidencia modificó el modelo económico de la compañía para permitir estimaciones alternativas para el efecto del tratamiento de la cladribina y sus comparadores en la tasa de recaída y la progresión de la discapacidad a los 6 meses. El grupo de revisión realizó otros cambios en el modelo de la empresa. Después de implementar todas las pruebas cladribina siguió siendo rentable en los subgrupos RES-RRMS y SOT-RRMS. El Comité de Evaluación reconoció la incertidumbre en los datos disponibles, pero concluyó que cladribina podría considerarse una alternativa costo-efectiva desde la perspectiva del Servicio Nacional de Salud.			
Horizonte temporal	50 años			
Tasa de descuento	3.5%			
Comparadores	Alemtuzumab, daclizumab, fingolimod y natalizumab			
Tamaño del ciclo	1 año			
Resultados	Los principales problemas que surgieron durante esta ETA se derivaron de la definición post-hoc de subgrupos y resultados clínicos. La evidencia proporcionada por la compañía se centró en el uso de cladribina para pacientes con RES-RRMS y SOTRRMS. El efecto de los DMT en la desaceleración de la progresión de la discapacidad fue el mayor impulsor de la rentabilidad en el modelo económico. Los tamaños de las muestras para los subgrupos RES-RRMS y SOT-RRMS fueron pequeños, por lo que no hubo pruebas clínicas directas de efectividad suficientes para que el ERG concluya que la cladribina fue mejor que el placebo para reducir la progresión de la enfermedad. La evidencia indirecta también fue débil para los subgrupos. Sin embargo, tanto la evidencia directa como la indirecta mostraron que el tratamiento con cladribina fue estadísticamente significativo Es mejor que el placebo para retrasar la progresión de la enfermedad y reducir la tasa de recaída. El AC tomó la decisión de recomendar el uso de cladribina para pacientes con RESRRMS y SOT-RRMS en función del resultado de la eficacia clínica en la población de HDA-RRMS, para lo cual se debería haber			

Fuente: Elaboración propia



Tabla 9. Principales características de la evidencia económica seleccionada (Hettle, Harty, & Wong, 2018).

Autor	(Hettle, Harty, & Wong, 2018)
Título	Cost-effectiveness of cladribine tablets, alemtuzumab, and natalizumab in the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis with high disease activity in England
Tipo de Evaluación Económica	Análisis costo efectividad
País	Inglaterra
Perspectiva	Perspectiva del financiador
Metodología	Se desarrolló un modelo de Markov basado en cohortes con 11 estados de salud (10 Escala de estado de discapacidad expandida [EDSS] más muerte). Se usaron matrices de transición del registro de la Columbia Británica para modelar la historia natural de EDSS. El efecto del tratamiento en la EDSS se modeló utilizando índices de riesgo para una progresión de discapacidad confirmada durante 6 meses a partir de una comparación de tratamiento indirecto (ITC).
	Las recaídas y los eventos adversos relacionados con las drogas se modelaron a través de las tasas de recaída anualizadas y las probabilidades de eventos.
	con costos asociados y pérdidas de año de vida ajustadas por calidad (AVAC). Las utilidades se derivaron de los ensayos y la literatura, y los costos de NHS y fuentes de literatura. La incertidumbre se evaluó mediante análisis de sensibilidad probabilístico y determinístico.
Horizonte temporal	50 años
Tasa de descuento	3.5%
Comparadores	Alemtuzumab y natalizumab,
Tamaño del ciclo	Anual
Resultados	Las tabletas de cladribina fueron dominantes (es decir, menos costosas y más efectivas) versus alemtuzumab y natalizumab en las comparaciones por pares, y la estrategia dominante en los análisis completamente incrementales.
	El costo incremental fue impulsado en gran medida por los costos de adquisición y administración de medicamentos, y el AVAC incremental se ganó en gran medida por las diferencias en la progresión de EDSS retrasada. Las tabletas de cladribina tenían una probabilidad del 93% de ser rentables en un umbral de PIB 30,000 por el AVAC ganado, y permanecieron dominantes en los análisis de escenarios probados. La mayor influencia en los resultados fue el efecto del tratamiento en la progresión de la discapacidad derivada de la ITC.

Fuente: Elaboración propia



Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. Creamos modelos, construimos soluciones.

3.5 Conclusiones

Posterior a la búsqueda sistemática de estudios de evaluación económica y revisión de los estudios del uso de cladribina (MAVENCLAD®) en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad, se seleccionaron dos estudios, de los cuales se puede concluir que el uso de cladribina (MAVENCLAD®) es una alternativa dominante o bien costo-efectiva mejorando la calidad de vida de los pacientes con este padecimiento.



Capítulo 4. Metodología de la evaluación económica del uso de cladribina (MAVENCLAD®) en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad.

4.1 Alcance y objetivos

Realizar un estudio de evaluación económica completa del uso de cladribina (MAVENCLAD®) en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad en comparación con fingolimod y natalizumab desde la perspectiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

4.2 Tipo de evaluación económica

Evaluación económica completa del tipo minimización de costos.

4.3 Tipo de análisis conducido

El presente estudio de evaluación económica propuesto corresponde a un análisis del tipo minimización de costos de acuerdo con los resultados del estudio publicado por (Berardi, Siddiqui, Treharne, Harty, & Wong, 2019) este artículo fue seleccionado en la revisión sistemática de la evidencia clínica y demostró que el uso de cladribina (MAVENCLAD®) en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad, es equivalente en términos de eficacia y seguridad, considerando como medida de resultado la tasa anualizada de recaídas.

4.4 Población objetivo

Pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad

4.5 Comparadores

Las opciones por comparar en el presente estudio se seleccionaron con base en las recomendaciones de las guías de práctica clínica internacionales y en las opciones disponibles en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Por tanto, las alternativas utilizadas en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad son:



Tabla 10. Compradores seleccionados para la evaluación económica.

Intervención	Indicación
Fingolimod	Esclerosis múltiple remitente recurrente con algún factor de mal pronóstico.
	En pacientes con falla o intolerancia a tratamiento con Interferón beta, Acetato de Glatiramer o Dimetilfumarato.
	Cambio de tratamiento después de haber utilizado natalizumab.
Natalizumab	Esclerosis múltiple remitente recurrente en ausencia de factores de mal pronóstico.
	Falla a otros tratamientos modificadores.

Fuente: Elaboración propia

4.6 Perspectiva del análisis

El análisis se realizó desde la perspectiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

4.7 Datos de eficacia/efectividad y seguridad

Los datos para sustentar el análisis de minimización de costos tomaron de la literatura clínica (Berardi, Siddiqui, Treharne, Harty, & Wong, 2019).

En esta revisión sistemática con meta-análisis se evalúan pacientes tratados con TME altamente efectivas, como fingolimod y natalizumab. Se tomaron como medidas de eficacia la progresión de la enfermedad confirmada a 6 meses y tasa anualizada de recaídas, específicamente en pacientes con EMRR con alta actividad de la enfermedad.

En la siguiente tabla (Tabla 12) se muestran los resultados obtenidos de cladribina en comparación con fingolimod y natalizumab.

Tabla 11. Efecto estimado de cladribina en comparación con las demás DMT evaluadas.

Cladribina vs	ARR	CDP-6M
Cidanbilia vs	RR (IC 95%)	HR (IC 95%)
Alemtuzumab	1.200 (0.886 – 1.632)	0.918 (0.396 – 2.232)
Fingolimod	0.886 (0.686 – 1.142)	0.765 (0.402 – 1.439)
Natalizumab	1.162 (0.886 – 1.527)	1.080 (0.530 – 2.215)
Ocrelizumab	1.062 (0.778 – 1.446)	0.866 (0.359 – 2.015)

Fuente: (Berardi, Siddiqui, Treharne, Harty, & Wong, 2019)



4.8 Horizonte temporal

El horizonte temporal seleccionado para el presente análisis se basa en la historia natural de la enfermedad y la evidencia clínica disponible el cual es de 4 años ya que los estudios utilizados en el meta-análisis (Siddiqui, y otros, 2018) donde se evalúa el uso de cladribina se ha demostrado que después de completar los 2 cursos de tratamiento (2 años), no se requiere ningún tratamiento adicional con cladribina en los años 3 y 4.

4.9 Modelaje

Dado que la presente evaluación corresponde a un análisis de minimización costos, no se utilizaron métodos de modelaje por lo que únicamente se consideraron los costos médicos directos relacionados con el tratamiento de esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad en el horizonte temporal establecido.

4.10 Utilización de recursos y costos

Todos los costos utilizados en la presente evaluación económica fueron transformados a dólares, utilizando un tipo de cambio de 7.71 quetzales de Guatemala (Banco Guatemala, 2019).

En este análisis se consideraron los costos médicos directos asociados con las alternativas evaluadas, los cuales son:

- Costo de adquisición de los fármacos.
- Costo de administración.
- Costo de monitoreo de los pacientes.

Los costos de los fármacos y sus referencias se muestran a continuación (Tabla 13):

Tabla 12. Costo de los fármacos.

Concepto	Presentación	Costo por presentación	Fuente
Cladribina (MAVENCLAD®)	1 tableta, 10 mg	\$4,500.00*	Merck
Fingolimod	Fingolimod capsula .56 mg/.50 mg envase con 28 capsulas	\$2,992.97	GUATECOMPRAS http://www.guatecompras.gt/o fertas/MejorOfertaElectronica.a spx?m=1&nog=9510427&o=5
Natalizumab	Natalizumab. Solución inyectable. Cada frasco ámpula contiene: natalizumab 300 mg. envase con frasco ámpula con 300 mg.	\$3,160.82	GUATECOMPRAS http://www.guatecompras.gt/o fertas/MejorOfertaElectronica.a spx?m=1&nog=9610448&o=5

^{*} Precio descontando el Impuesto al Valor Agregado (IVA), equivalente al 12%, véase Anexo 2. **Fuente:** Elaboración propia.



Por otro lado, las dosis de cada intervención se obtuvieron de las evaluadas en el meta-análisis (Siddiqui, y otros, 2018), estos se muestra a continuación:

Tabla 13. Dosis de las opciones terapéuticas evaluadas.

Intervención	Dosis	Fuente
Cladribina (MAVENCLAD®)	La dosis acumulada recomendada de cladribina es de 3,5 mg/kg de peso corporal a lo largo de dos años, administrados en forma de un curso de tratamiento de 1,75 mg/kg por año. Cada curso de tratamiento consiste en dos semanas de tratamiento, una al inicio del primer mes y otra al inicio del segundo mes del año de tratamiento respectivo. Cada semana de tratamiento consiste en cuatro o cinco días en los que el paciente recibe 10 mg o 20 mg (uno o dos comprimidos) como dosis diaria única, dependiendo del peso corporal.	Información para Prescribir Amplia (FDA, 1993)
Fingolimod	Oral. Adultos: 0.5 mg cada 24 horas.	(Calabresi, y otros, 2014) (FDA, 2010)
Natalizumab	Intravenosa. Adultos y ancianos menores de 65 años: 300 mg cada 28 días.	(Polman, y otros, 2006) (FDA, 2004)

Fuente: Elaboración propia

Para el caso del tratamiento con cladribina (MAVENCLAD®) el cual su administración está en función del peso corporal del paciente se consideró una proporción de 3:1 mujeres por hombres y se utilizó el peso promedio de las mujeres de 65.4 kg y de 77.7 kg para hombres, esto con base en lo reportado en (Walpole, y otros, 2012) mediente estos parámetros el **peso ponderado es de 68.48 kg**. Con base en lo anterior y las dosis recomendadas para el caso de fingolimod y natalizumab se estimó el número de tabletas o viales necesarias por paciente al año durante los 4 años del horizonte temporal.

Tabla 14. Número de tabletas/viales por paciente anual.

Intervención	Tabletas/viales año 1	Tabletas/via les año 2	Tabletas/vial es año 3	Tabletas /viales año 4	Total de Tabletas/viales
Cladribina	12	12	0	0	24
(MAVENCLAD®)					
Fingolimod	365	365	365	365	1460
Natalizumab	13	13	13	13	52

Fuente: Elaboración propia.



Asimismo, los costos de los recursos utilizados para la administración y seguimiento del tratamiento se obtuvieron de fuentes públicas proporcionados por Merck, estos se muestran a continuación:

Tabla 15. Costos utilizados para la administración y seguimiento del tratamiento.

Concepto	Costo unitario
Electrocardiograma	\$46.05
Infusión de medicamento	\$237.00
Resonancia magnética	\$338.52
Análisis sanguíneo	\$12.94
Visitas al neurólogo	\$46.05
Prueba cutánea de tuberculina	\$13.00
Prueba de bioquímica	\$12.94
Evaluación oftalmológica	\$26.31
Prueba del virus de JC	\$647.17

Fuente: Elaboración propia.

El número de recursos utilizados tanto para la administración de los fármacos y monitoreo se obtuvo de la literatura publicada, así como del panel de expertos realizado, a continuación, se muestra la utilización de recursos por brazo de análisis:

Tabla 16. Recursos utilizados para la administración de tratamiento.

Intervención	Concepto	Primer año	Segundo año	Fuente
Cladribina (MAVENCLAD®)	No requiere recursos adicionales para su administración	0	0	(Giovannoni , y otros, 2010) IPP-A
Fingolimod	Electrocardiograma la primera vez que se administra	1	0	(Calabresi, y otros, 2014) (FDA, 2010)
Natalizumab	Infusiones mensuales del medicamento (13 al año)	13	26	(Polman, y otros, 2006) (FDA, 2004)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17. Recursos utilizados para el monitoreo de tratamiento.

Intervención	Primer año	Primer año	Segundo año de seguimiento	Fuente



	Resonancia magnética	1	0	(Giovannoni, y otros,
Cladribina	Análisis sanguíneo	3	3	2010)
(MAVENCLAD®)	Visitas al neurólogo	2	1	
	Prueba cutánea de tuberculina	1	0	— IPP-A
	Resonancia magnética	1	0	
	Análisis sanguíneo	4	2	(Calabresi, y otros,
Fingolimod	Prueba de bioquímica	6	2	2014)
	Evaluación oftalmológica	1	0	(FDA, 2010)
	Visitas al neurólogo	3	1	
	Prueba del virus de JC	1	2	
Natalizumab	Prueba de bioquímica	2	2	(Polman, y otros, 2006)
	Resonancia magnética	1	1	(FDA, 2004)
	Visita al neurólogo	2	2	

Fuente: Elaboración propia.

Dado que la literatura únicamente reporta la utilización de recursos para el primer y segundo año de tratamiento, se asumió la misma cantidad de utilización de recursos del año 2 para los años 3 y 4.

4.11 Tasa de descuento

Se consideró una tasa de descuento del 5% para los resultados en costos.

4.12 Variabilidad e incertidumbre

Se realizó un análisis de sensibilidad determinístico univariado sobre las variables que mayor incertidumbre representan en el modelo. Este análisis se realiza sobre el caso base para probar la robustez del modelo y permear la incertidumbre.

Las variables sobre las cuales se realizó dicho análisis fueron el costo de cladribina (MAVENCLAD®), el número de tabletas por tratamiento con cladribina (MAVENCLAD®) y la tasa de descuento, los cambios en dichas variables se muestran a continuación:

Tabla 18. Análisis de sensibilidad determinístico univariado.

Concepto	Variación mínima	Variación Máxima
Costo de cladribina (MAVENCLAD®)	-5%	+5%



Tasa de descuento (caso base 5%)	0%	7%
Número de tabletas por tratamiento con cladribina (MAVENCLAD®) (Caso base: 26 tabletas)	24 tabletas	28 tabletas
Horizonte temporal (caso base: 4 años)	2 años	De por vida

Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 5 Resultados del Estudio de Evaluación Económica

5.1 Resultados de la minimización de costos

Los resultados del análisis de minimización costos arrojaron que el uso de cladribina (MVENCLAD®) en horizonte temporal de 4 años es una alternativa costo-ahorradora comparada con fingolimod y natalizumab en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de costos totales y desagregados por brazo de tratamiento:

Tabla 19. Costo anual por paciente del tratamiento farmacológico.

Intervención	Costo año 1	Costo año 2	Costo año 3	Costo año 4	Total a 4 años
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$55,714.29	\$53,061.22	\$0.00	\$0.00	\$108,775.51
Fingolimod	\$37,157.62	\$35,388.21	\$33,703.06	\$32,098.15	\$138,347.04
Natalizumab	\$39,133.96	\$37,270.44	\$35,495.66	\$33,805.39	\$145,705.45

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20. Costo anual por paciente del monitoreo que requiere cada una de las intervenciones

Intervención	Costo año 1	Costo año 2	Costo año 3	Costo año 4	Total a 4 años
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fingolimod	\$43.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.86
Natalizumab	\$2,934.29	\$2,794.56	\$2,661.48	\$2,534.75	\$10,925.07

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21. Costo anual de monitoreo del fármaco, por paciente.

Intervención	Costo año 1	Costo año 2	Costo año 3	Costo año 4	Total a 4 años
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$459.48	\$76.99	\$39.78	\$37.89	\$614.13
Fingolimod	\$602.30	\$46.96	\$44.72	\$42.59	\$736.58
Natalizumab	\$1,051.12	\$1,588.07	\$1,512.45	\$1,440.43	\$5,592.07

Fuente: Elaboración propia.



En las tablas anteriores se puede observar que cladribina (MAVENCLAD®) no requiere de infraestructura adicional para la administración de tratamiento y la utilización de recursos para el monitoreo es la menos costosa después de fingolimod. A continuación, se muestran los costos totales por paciente a 4 por cada brazo de tratamiento:

Tabla 22. Resultados del análisis de minimización de costos.

Intervención	Costo total por paciente	Ahorro
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$109,389.64	
Fingolimod	\$139,127.47	\$29,737.83
Natalizumab	\$162,222.59	\$52,832.95

Fuente: Elaboración propia.

Lo resultados mostrados en la tabla anterior muestran que el uso de cladribina (MVENCLAD®) en horizonte temporal de 4 años es genera ahorros de \$29.737.83 comparado con fingolimod y \$52,832.95 comparado con natalizumab en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad, lo que hace a Cladribina (MAVENCLAD®) una alternativa costo ahorradora.

5.2 Resultados del análisis de sensibilidad

Con el objetivo de probar la robustez del modelo y permear la incertidumbre de las variables consideradas, se realizó un análisis de sensibilidad determinístico univariado en el cual se modificó el costo de cladribina (MAVENCLAD®) en ±5%, la tasa de descuento en 0% y 7% así como el número total de tabletas requeridas por tratamiento con cladribina (MAVENCLAD®), esta variable se modificó en 24 tabletas y 28 tabletas ya que el peso de los pacientes puede ser variable lo que puede modificar el número total de tabletas por tratamiento.

Los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad determinístico univariado demostró que **en todos los casos el uso de** cladribina (MAVENCLAD®) se mantiene siendo una opción costo-ahorradora sin modificar el caso base de manera sustancial, por lo que se puede concluir con base en el presente análisis de sensibilidad determinístico que el modelo y sus resultados son robustos ante condiciones de incertidumbre, en la siguiente tabla se muestran los resultados del análisis de sensibilidad determinístico.



Tabla 23. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico univariado.

Resultados caso base		
Intervención	Costo por paciente	Ahorro
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$109,389.64	\$0.00
Fingolimod	\$139,127.47	\$29,737.83
Natalizumab	\$162,222.59	\$52,832.95
Costo clad	dribina -5%	
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$103,951	\$0
Fingolimod	\$139,127	\$35,176.61
Natalizumab	\$162,223	\$58,271.72
Costo clad	dribina +5%	
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$114,828	\$0
Fingolimod	\$139,127	\$24,299.06
Natalizumab	\$162,223	\$47,394.17
Tasa de de	scuento 0%	
Cladribina (MAVENCLAD ®)	\$117,659	\$0
Fingolimod	\$156,896	\$39,236.36
Natalizumab	\$183,043	\$65,383.43
Tasa de de	scuento 7%	
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$106,367	\$0
Fingolimod	\$132,915	\$26,548.00
Natalizumab	\$154,944	\$48,577.59
Número de tabletas c	ladribina (24 tabletas)	
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$101,022	\$0
Fingolimod	\$139,127	\$38,105.18



Natalizumab	\$162,223	\$61,200.29		
Número de tabletas o	Número de tabletas cladribina (28 tabletas)			
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$117,757	\$0		
Fingolimod	\$139,127	\$21,370.49		
Natalizumab	\$162,223	\$44,465.60		
Horizonte temooral de 2 años				
Fingolimod	\$73,238.95	-\$36,073.03		
Natalizumab	\$84,772.44	-\$24,539.54		
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$109,311.98	\$0.00		
Horizonte temporal de por vida				
Cladribina (MAVENCLAD®)	\$110,034	\$0		
Fingolimod	\$686,068	\$576,033.49		
Natalizumab	\$805,136	\$695,101.59		

Fuente: Elaboración propia.



Capítulo 6. Discusión

6.1 Resumen de resultados

El análisis de minimización de costos donde se consideraron los costos médicos directos asociados a cada intervención (costo de adquisición de fármacos, costo de administración y monitoreo) demostró que el uso de cladribina (MVENCLAD®) tienen un costo total descontado por paciente a 4 años de \$109,389.64 mientras que fingolimod y natalizumab tienen un costo total descontado por paciente a 4 años de \$139,127 y \$162,223, respectivamente. Lo que se traduce en un ahorro de \$29,737.83 comparado con fingolimod y 52,832.95 comparado con natalizumab en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad, siendo así Cladribina (MAVENCLAD®) una alternativa costo ahorradora.

6.2 Limitaciones del estudio

Algunas de las limitaciones del presente estudio de evaluación económica están relacionadas con los supuestos considerados para el análisis, los cuales fueron el peso promedio de los pacientes, incertidumbre que se permeó en el análisis de sensibilidad determinístico donde se demostró que el cambio en el número de tabletas no modifica los resultados del caso base de manera sustancial.

6.3 Generalización

De acuerdo con los estudios clínicos utilizados como base en esta evaluación económica, el uso de cladribina (MAVENCLAD®) en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad se extiende a todas poblaciones de interés. Cabe señalar que las características de los pacientes evaluados en los estudios clínicos son muy similares a los de los pacientes mexicanos; esto nos permite que los resultados del análisis económico aquí presentado sean aplicables a los pacientes atendidos en el sector público de salud de Guatemala.



Capítulo 7. Conclusiones

La evidencia clínica presentada en el presente análisis demostró que el uso de cladribina (MAVENCLAD®) en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente con alta actividad de la enfermedad en comparación con fingolimod y natalizumab posee eficacia similar considerando como medida de resultados la tasa anualizada de recaídas, además se demostró en la presente evaluación económica que cladribina (MAVENCLAD®) es una opción costo-ahorradora desde la perspectiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Asimismo, es una alternativa que atiende una demanda insatisfecha simplificando el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente con alta actividad de la enfermedad.

Por último, se demostró en el análisis de sensibilidad determinístico univariado que el modelo es robusto ante condiciones de incertidumbre ya que al modificar las variables más relevantes del análisis estas no se modificaron de manera sustancial respecto al caso base.

Capítulo 8. Conflicto de intereses

Los autores del presente estudio declaran no tener conflicto de intereses.



Bibliografía

- AAN. (2018). Practice guideline: Disease-modifying therapies for adults with multiple sclerosis. EE.UU: American Academy of Neurology.
- Aguirre, L., Flores, J., De la Cruz, D., Rangel, E., & Corona, T. (2011). Multiple sclerosis in Caucasians and Latino Americans. *Autoimmunity*, 44(7), 571–575.
- Alroughani, R., Inshasi, J., Deleu, D., Al-Hashel, J., Shakra, M., & Elalamy, O. (2019). An Overview of High-Efficacy Drugs for Multiple Sclerosis: Gulf Region Expert Opinion. *Neurol Ther.*, 8(1), 13-23.
- Arrambide, G., de la Maza, M., Pérez, J., Duriez, E., Dondis, D., & Avila, M. (2004). The prevalence of multiple sclerosis in th city of San Pedro. *Arq Neuro-Psiquiatr*, 62(11).
- Banco Guatemala. (2019, Octubre 25). Banco de Guatemala. Retrieved from Banco de Guatemala: https://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/cambio/T20191001
- Barin, L., Salmen, A., Disanto, G., Babačić, H., Calabrese, P., & Chan, A. (2018). The disease burden of Multiple Sclerosis from the individual and population perspective: Which symptoms matter most? *Mult Scler Relat Disord*, 25, 112-121.
- Berardi, A., Siddiqui, M., Treharne, C., Harty, G., & Wong, S. (2019). Estimating the comparative efficacy of cladribine tablets versus alternative disease modifying treatments in active relapsing-remitting multiple sclerosis: adjusting for patient characteristics using meta-regression and matching-adjusted indirect treatmen. *Curr Med Res Opin, 35*(8), 1371-1378.
- CADTH. (2013). Recommendations for Drug Therapies for Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Canada: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health.
- Calabresi, P., Radue, E., Goodin, D., Jeffery, D., Rammohan, K., & Reder, A. (2014). Safety and efficacy of fingolimod in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis (FREEDOMS II): a double-blind, randomised, placebocontrolled, phase 3 trial. *Lancet Neurol*, 13(6), 545-56.
- Comi, G., Hartung, H., Kurukulasuriya, N., Greenberg, S., & Scaramozza, M. (2013). Cladribine tablets for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis. *Expert Opin Pharmacother*, 14(1), 123-36.



- Cristiano, E., & Ignacio, J. (2017). Multiple sclerosis epidemiology in Latin America: An updated survey. *Mult Scler J Exp Transl Clin*, 3(2), 1-7.
- EMA. (2017, 09 23). European Medicines Agency. Retrieved from https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/mavenclad
- FDA. (1993). HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION- MAVENCLAD (Cladribine). EE.UU: Food and Drug Administration.
- FDA. (2004). HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION TYSABRI. EE.UU: Food and Drug Administration.
- FDA. (2010). HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION GILENYA. EE.UU: Food and Drug Administration.
- Fernández, O., Cuevas, C, Núñez, L., Carrasco, H., Ordoñez, L., & DeLaMaza, J. (2016). Esclerosis múltiple: Situación actual y tendencias futuras. *Revista Mexicana de Neurociencia*, 17(6), 3-22.
- Ghasemi, N., Razavi, S., & Nikzad, E. (2017). Multiple Sclerosis: Pathogenesis, Symptoms, Diagnoses and Cell-Based Therapy. *Cell J.*, 19(1), 1-10.
- Giovannoni, G., Comi, G., Cook, S., Rammohan, K., Rieckmann, P., & Soelberg, P. (2010). A placebo-controlled trial of oral cladribine for relapsing multiple sclerosis. *N Engl J Med.*, 362(5), 416-26.
- Giovannoni, G., Soelberg, P., Cook, S., Rammohan, K., Rieckmann, P., & Comi, G. (2018). Efficacy of Cladribine Tablets in high disease activity subgroups of patients with relapsing multiple sclerosis: A post hoc analysis of the CLARITY study. *Mult Scler*, 1-9.
- Giovannoni, G., Soelberg, P., Cook, S., Rammohan, K., Rieckmann, P., & Comi, G. (2018). Safety and efficacy of cladribine tablets in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: Results from the randomized extension trial of the CLARITY study. *Mult Scler*, 24(12), 1594-1604.
- Giovannoni, G., Soelberg, P., Cook, S., Rammohan, K., Rieckmann, P., & Comi, G. (2019). Efficacy of Cladribine Tablets in high disease activity subgroups of patients with relapsing multiple sclerosis: A post hoc analysis of the CLARITY study. *Mult Scler*, 25(6), 819-827.
- Göksel, A., Kaya, T., Günaydn, R., Demirhan, A., Ce, P., & Gedizlioğlu, M. (2011). Quality of life in patients with multiple sclerosis: the impact of depression, fatigue, and disability. *Int J Rehabil Res, 34*(4), 290-8.



- Goris, A., Dubois, B., & Hilven, K. (2016). Chapter 8 Role of Genetic Factors in Pathophysiology of Multiple Sclerosis. In *Multiple Sclerosis A mechanistic view* (pp. 153-80). Academic Press.
- Hettle, R., Harty, G., & Wong, S. (2018). Cost-effectiveness of cladribine tablets, alemtuzumab, and natalizumab in the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis with highdisease activity in England. *Journal of Medical Economics*. doi:10.1080/13696998.2018.1461630
- Higgins, J., & Green, S. (2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Vol. 5.1.0). The Cochrane Collaboration.
- Holmøy, T., Torkildsen, Ø., & Myhr, K. (2017). An update on cladribine for relapsing-remitting multiple sclerosis. *Expert Opin Pharmacother.*, 18(15), 1627-1635.
- Huang, W., Chen, W., & Zhang, X. (2017). Multiple sclerosis: Pathology, diagnosis and treatments. Exp Ther Med, 13(6), 3163-3166.
- Isaksson, A., Ahlström, G., & Gunnarsson, L. (2005). Quality of life and impairment in patients with multiple sclerosis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 76(1), 64-9.
- Lambe, T., Duarte, R., Mahon, J., Nevitt, S., Greenhalgh, J., Boland, A., . . . Pomeroy, I. (2018). Cladribine Tablets for the First-Line Treatment of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: An Evidence Review Group Perspective of a NICE Single Technology Appraisal. *PharmacoEconomics*. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s40273-018-0718-2
- Loma, I., & Heyman, R. (2011). Multiple sclerosis: pathogenesis and treatment. *Curr Neuropharmacol*, 9(3), 409-16.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D., & Group., P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *Ann Intern Med*, 151(4), 264-9.
- Montalban, X., Gold, R., Thompson, A., Otero, S., Amato, M., & Chandraratna, D. (2018). ECTRIMS/EAN Guideline on the pharmacological treatment of people with multiple sclerosis. *Mult Scler*, 24(2), 96-120.
- NICE. (2017). Cladribine tablets for treating relapsing–remitting multiple sclerosis. Reino Unido: National Institute for Health and Care Excellence.
- Olek, M., & Howard, J. (2018, Septiembre 28). Clinical presentation, course, and prognosis of multiple sclerosis in adults. Retrieved from UpToDate: https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-course-and-prognosis-of-multiple-sclerosis-in-adults



- Olek, M., & Mowry, E. (2018, Octubre 17). Pathogenesis and epidemiology of multiple sclerosis. Retrieved from UpToDate:

 https://www.uptodate.com/contents/pathogenesis-and-epidemiology-of-multiple-sclerosis
- Olek, M., H, & J. (2018, Noviembre 05). Evaluation and diagnosis of multiple sclerosis in adults. Retrieved from UpToDate:

 https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-diagnosis-of-multiple-sclerosis-in-adults
- Pakpoor, J., Disanto, G., Altmann, D., Pavitt, S., Turner, B., & Marta, M. (2015). No evidence for higher risk of cancer in patients with multiple sclerosis taking cladribine. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm*, 2(6), e158.
- Pakpoor, J., Disanto, G., Altmann, D., Pavitt, S., Turner, B., & Marta, M. (2015). No evidence for higher risk of cancer in patients with multiple sclerosis taking cladribine. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm*, 2(6), e158.
- PLM. (2018, Noviembre). *PLM*. Retrieved from Fingolimod: http://www.medicamentosplm.com/home/productos/gilenya_capsulas/12 2/101/44575/14
- PLM. (2018, Noviembre). *PLM*. Retrieved from Natalizumab: http://www.medicamentosplm.com/home/productos/tysabri_solucion_para_infusion/51/101/33807/179
- Polman, C., O'Connor, P., Havrdova, E., Hutchinson, M., Kappos, L., & Miller, D. (2006). A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. *N Engl J Med*, 354(9), 899-910.
- Popescu, B., Pirko, I., & Lucchinetti, C. (2013). Pathology of multiple sclerosis: where do we stand? Continuum, 19(4), 901-21.
- Ramagopalan, S., Dobson, R., Meier, U., & Giovannoni, G. (2010). Multiple sclerosis: risk factors, prodromes, and potential causal pathways. *Lancet Neurol*, 9(7), 727-39.
- Rolak, L. (2003). Multiple Sclerosis: It's Not The Disease You Thought It Was. *Clin Med Res, 1*(1), 57–60.
- Scolding, N., Barnes, D., Cader, S., Chataway, J., Chaudhuri, A., & Coles, A. (2015). Association of British Neurologists: revised (2015) guidelines for prescribing disease-modifying treatments in multiple sclerosis. *Pract Neurol*, 15(4), 273-9.



- Siddiqui, M., Khurana, I., Budhia, S., Hettle, R., Harty, G., & Wong, S. (2018).

 Systematic literature review and network meta-analysis of cladribine tablets versus alternative disease-modifying treatments for relapsing-remitting multiple sclerosis. *Curr Med Res Opin*, 34(8), 1361-71.
- SSA. (2010). Tratamiento modificador de enfermedad en pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple. México: CENETEC.
- Velázquez, M., Macías, M., Rivera, V., & Lozano, J. (2003). Esclerosis Múltiple en México. Un estudio Multicéntrico. *Rev Neurol*, 36, 1019-1022.
- Walpole, S. C., Prieto-Merino, D., Edwards, P., Cleland, J., Stevens, G., & Roberts, I. (2012). The weight of nations: an estimation of adult human biomass. *BMC Public Health*. Retrieved from https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-439
- WHO. (2017, 12 20). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Retrieved from ATC/DDD Index 2018: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
- Wu, G., & Alvarez, E. (2011). The immunopathophysiology of multiple sclerosis. Neurol Clin, 29(2), 257-78.



Anexo 1. Revisión sistemática de la literatura

A1.1 Objetivos de la revisión sistemática

Evaluar la eficacia y seguridad de cladribina (Mavenclad®) como DMT en pacientes con EMRR con alta actividad de la enfermedad (ver la Tabla 25).

Tabla 24. Pregunta de investigación para la revisión sistemática.

PREGUNTA PICO		
Pacientes	Pacientes con EMRR con alta actividad de la enfermedad	
Intervención	Cladribina (Mavenclad®)	
Comparador	Fingolimod Natalizumab	
Resultados (Outcomes)	 Eficacia Progresión de la enfermedad Número de recaídas Seguridad Eventos adversos 	

Fuente: Elaboración propia

A1.2 Metodología

A1.2.1 Criterios de inclusión y exclusión

Se consideraron publicaciones en texto completo de estudios clínicos aleatorizados, así como revisiones sistemáticas y meta-análisis. Se incluyeron aquellos estudios publicados en español e inglés. Por otra parte, se excluyeron cartas editoriales, resúmenes de publicaciones y posters publicados en congresos.

A1.2.2 Palabras clave empleadas

- a. Términos para el padecimiento:
 - o ""Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting"[Mesh]
 - o "Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting/drug therapy"[Mesh]
 - "Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting/therapy"[Mesh]
 - o "Relapsing-remitting multiple sclerosis" [All Fields]
 - "Multiple Sclerosis/drug therapy"[Mesh]
 - o "Multiple Sclerosis/therapy"[Mesh]
 - "Multiple Sclerosis"[Mesh]
 - "Multiple sclerosis"[All Fields]
- b. Términos para la intervención y comparador:
 - o "Cladribine"[Mesh]
 - "Cladribine"[All Fields]
 - "Natalizumab"[Mesh]
 - "Natalizumab"[All Fields]



- "Fingolimod Hydrochloride"[Mesh]
- "Fingolimod"[All Fields]
- "Disease modifying treatments"[All Fields]

A1.2.3 Localización de los estudios

Se realizó una búsqueda exhaustiva de la información, incluyendo las bases de datos: Medline/ Pubmed, Biblioteca Cochrane, Imbiomed, LILACS, Nieto Editores y Medigraphic hasta el 24 de septiembre de 2019.

A1.2.4 Estrategia de búsqueda

A continuación, se muestran ejemplos de las estrategias de búsqueda realizadas en PubMed y adaptadas para otras bases de datos:

- 1. (("Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting"[Mesh] OR "Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting/drug therapy"[Mesh]) OR "Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting/therapy"[Mesh] OR "relapsing-remitting multiple sclerosis"[All Fields1) OR ("Multiple Sclerosis/drug therapy"[Mesh] OR "Multiple Sclerosis/therapy"[Mesh] OR "Multiple Sclerosis"[Mesh] OR "multiple sclerosis"[All Fields]) AND (("Cladribine"[Mesh] OR "cladribine"[All Fields]) AND ("Natalizumab"[Mesh] OR "natalizumab"[All Fields]) AND ("Fingolimod Hydrochloride"[Mesh] OR "fingolimod"[All Fields])) AND ((Clinical Study[ptyp] OR Clinical Trial[ptyp] OR Controlled Clinical Trial[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND (Spanish[lang] OR English[lang]))
- 2. (("Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting"[Mesh] OR "Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting/drug therapy"[Mesh]) OR "Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting/therapy"[Mesh] OR "relapsing-remitting multiple sclerosis"[All ("Multiple Fields]) OR Sclerosis/drug therapy"[Mesh] OR "Multiple Sclerosis/therapy"[Mesh] OR "Multiple Sclerosis"[Mesh] "multiple OR sclerosis"[All Fields]) AND "disease modifying treatments"[All Fields] AND ((Clinical Study[ptyp] OR Clinical Trial[ptyp] OR Controlled Clinical Trial[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb]) AND (Spanish[lang] OR English[lang]))

A1.2.5 Algoritmo de búsqueda

En la Tabla 26 se muestra el algoritmo de búsqueda utilizado en la revisión sistemática.



Tabla 25. Ejemplo de la descripción del algoritmo de búsqueda.

Ejemplo de algoritmo de búsqueda		
1.	Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis	
2.	Multiple Sclerosis	
3.	#1 AND #2	
4.	Cladribine	
5.	Natalizumab	
6.	Fingolimod Hydrochloride	
7.	#4 AND (#5 OR #6)	
8.	Disease modifying treatments	
9.	#3 AND (#7 OR #8)	
10.	Clinical Study[ptyp]	
11.	Clinical Trial[ptyp]	
12.	Controlled Clinical Trial[ptyp]	
13.	Meta-Analysis[ptyp]	
14.	Randomized Controlled Trial[ptyp]	
15.	Systematic[sb]	
16.	#10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15	
17.	Spanish	
18.	English	
19.	#17 OR #18	
20.	#9 AND (#16 AND #19)	

Fuente: Elaboración propia

A1.2.6 Selección de los estudios localizados

El filtro de los estudios fue realizado por dos investigadores expertos en el tema, seleccionándose aquellos que respondieran la pregunta de investigación y cumplieran los criterios de inclusión previamente definidos en el punto A1.2.1.

A1.2.7 Evaluación de la calidad de los estudios

Los estudios clínicos aleatorizados fueron evaluados por medio de la herramienta de "Riesgo de Sesgo" propuesta por la Colaboración Cochrane (Higgins & Green, 2011). En el caso de revisiones sistemáticas y meta-análisis, fueron evaluados por la declaración de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & Group., 2009).

A 1.2.8 Extracción de los datos de estudios individuales

Se recopiló el contenido de todos los artículos en una base de datos inicial con la finalidad de decidir si los datos obtenidos eran combinables o no para la realización de un meta-análisis, incluyendo el tipo de diseño, la población evaluada, la intervención y comparadores utilizados y el periodo de seguimiento reportado en los resultados.






A1.3 Resultados

A1.3.1 Artículos encontrados

En total se localizaron 107 publicaciones, de las cuales 16 fueron duplicados. Después de realizar una revisión de los títulos, se eliminaron 73 publicaciones que no fueron relevantes para la evaluación. Posteriormente se revisaron 18 resúmenes, donde 13 no evaluaron la intervención de interés y 3 más no fueron el tipo de estudio establecido en los criterios de inclusión. Por último, se realizó la lectura del texto completo de 2 estudios, de los cuales se eliminó una revisión sistemática publicada por la colaboración Cochrane debido a que evaluó pacientes con SCA. Finalmente se seleccionó una revisión sistemática con meta-análisis en red (Ilustración 2).



Ilustración 2. Algoritmo de PRISMA*



Fuente: Elaboración propia

^{*} En el diagrama se omiten las bases de datos Imbiomed y Medigraphic debido a que las estrategias de búsqueda desarrolladas no arrojaron resultados.



A1.3.2 Características del estudio seleccionado

A partir de la revisión sistemática se incluyeron 3 revisiones sistemáticas con metaanálisis en red. En la Tabla 27 se presenta una breve descripción de los estudios.

Tabla 26. Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática.

Estudio	Criterios de inclusión	Intervenciones evaluadas	Medidas de eficacia
(Berardi, Siddiqui, Treharne, Harty, & Wong, 2019)	Estudios clínicos aleatorizados que evalúen DMT en	Cladribina Alemtuzumab Fingolimod	Tasa de recaída anualizada
	pacientes con EMRR	Natalizumab Ocrelizumab	Progresión de la enfermedad sostenida por 6 meses a 24 meses
(Siddiqui, y otros, 2018)	Estudios clínicos aleatorizados que evalúen DMT en	Alemtuzumab Cladribina Dadizumab	Tasa de recaída anualizada
	pacientes con EMRR	Dimetilfumarato Fingolimod Acetato de glatiramer Interferon beta	Progresión de la enfermedad sostenida por 6 meses a 24 meses
		PEG interferonbeta Natalizumab Ocrelizumab Teriflunomida	Sin evidencia de actividad de la enfermedad a 24 meses
			Eventos adversos
(Pakpoor, y otros,	Estudios clínicos fase III	Cladribina	Tasa de neoplasmas
No evidence for	de DMT en pacientes	Acetato de glatiramer	Tasa de cáncer
higher risk of	con EM remitente y que	Dimetilfumarato	
cancer in	reporten la tasa de	Fingolimod	
patients with multiple sclerosis taking cladribine., 2015)	neoplasmas o cáncer presentado	Natalizumab Teriflunomida	

Fuente: Elaboración propia

Estimating the comparative efficacy of cladribine tablets versus alternative disease modifying treatments in active relapsing-remitting multiple sclerosis: adjusting for patient characteristics using meta-regression and matching-adjusted indirect treatment (Berardi, Siddiqui, Treharne, Harty, & Wong, 2019)

En esta publicación se toma como base la revisión sistemática publicada por Siddiqui (Siddiqui, y otros, 2018), en la cual se evaluó la eficacia y seguridad de cladribina en comparación con otras DMT en el tratamiento de pacientes con EMRR. El objetivo de este análisis fue realizar una meta-regresión que evalúe cladribina en comparación con comparadores de alta eficacia.



En total se identificaron 10,825 referencias en la revisión sistemática, de las cuales se incluyeron 49 estudios que cumplieron los criterios de inclusión. El análisis de meta-regresión tuvo un enfoque bayesiano, en el cual se evaluaron los estimados del efecto relativo de cladribina en comparación con alemtuzumab, natalizumab, fingolimod y ocrelizumab, en las siguientes poblaciones: HDA; RES (Enfermedad severa que evoluciona rápidamente); SOT (Terapia sub óptima). Las medidas de efectividad de relevancia para este análisis fueron progresión de la discapacidad sostenida por 6 meses (6M-CDP), empleando Hazard Ratio (HR); y tasa anualizada de recaída (ARR), empleando Rate Ratio (RR).

En pacientes con HDA, los resultados mostraron que cladribina no mostró diferencias estadísticamente significativas en comparación con los DMT evaluados (alemtuzumab, fingolimod, natalizumab y ocrelizumab), tanto en 6M-CDP como en ARR (Tabla 28). Estos resultados fueron consistentes con los otros subgrupos evaluados (ver llustración 3 e llustración 4).


Tabla 27. Efecto estimado de cladribina en comparación con las demás DMT evaluadas en la metaregresión.

Cladribina vs	ARR	CDP-6M
	RR (IC 95%)	HR (IC 95%)
Alemtuzumab	1.200 (0.886 – 1.632)	0.918 (0.396 – 2.232)
Fingolimod	0.886 (0.686 – 1.142)	0.765 (0.402 – 1.439)
Natalizumab	1.162 (0.886 – 1.527)	1.080 (0.530 – 2.215)
Ocrelizumab	1.062 (0.778 – 1.446)	0.866 (0.359 – 2.015)

Fuente: (Berardi, Siddiqui, Treharne, Harty, & Wong, 2019)




Ilustración 3. HR relativo a placebo para los comparadores por cada subgrupo de pacientes para 6M-CDP.



Fuente: (Berardi, Siddiqui, Treharne, Harty, & Wong, 2019)

Ilustración 4. RR relativo a placebo para los comparadores por cada subgrupo de pacientes para ARR.



Fuente: (Berardi, Siddiqui, Treharne, Harty, & Wong, 2019)



Systematic literature review and network meta-analysis of cladribine tablets versus alternative disease-modifying treatments for relapsing-remitting multiple sclerosis (Siddiqui, y otros, 2018).

Se presenta una revisión sistemática cuyo objetivo fue determinar la eficacia y seguridad comparativa entre tabletas de cladribina vs DMT en pacientes con EMRR.

Para llevar a cabo la revisión sistemática se revisaron las siguientes bases de datos: MEDLINE, Embase, MEDLINE In-Process y CENTRAL, empleando una combinación de términos MeSH y términos libres para identificar publicaciones de estudios clínicos aleatorizados en inglés. La búsqueda se llevó a cabo hasta enero de 2017. Se incluyeron resúmenes de conferencias y fueron identificados por medio de Embase.

Con los resultados obtenidos a partir de la revisión sistemática se llevó a cabo un meta-análisis en red Bayesiano, el cual se llevó a cabo en WinBUGS. Este análisis incluyó un modelo de efectos fijos y un modelo de efectos aleatorios. Cada análisis incluyó tres cadenas de Monte Carlo independientes, cada una con una muestra de 100,000 simulaciones. Se llevó a cabo un meta-análisis por cada medida de efectividad a evaluar: 1) Tasa de recaída anualizada; 2) Progresión confirmada de la enfermedad sostenido por 6 meses a 24 meses; 3) Progresión confirmada de la enfermedad sostenido por 3 meses a 24 meses; 4) Sin evidencia de actividad de la enfermedad a 24 meses.

En los análisis donde fue posible se llevó a cabo el análisis de subgrupo de pacientes con HRA + DAT. Cuando esta población no estuvo disponible, pero se tuvieran datos de población HRA o DAT, estos fueron empleados para generalizar a la población completa con HRA+DAT. Complementariamente se llevó a cabo un estudio de meta-regresión con respecto al riesgo basal, con la finalidad de explorar el impacto entre la heterogeneidad de los estudios sobre el efecto del tratamiento.


En total se identificaron 10,825 artículos. 49 estudios cumplieron los criterios de inclusión y fueron incluidos en la revisión. De estos, 44 estudios, donde se evaluaron 12 DMT, fueron incluidos en el análisis cuantitativo. Estos 44 estudios fueron publicados entre 1987 y 2017, mostrando variabilidad en el criterio de diagnóstico, cegado, fase de estudio, tamaño de muestra (31 a 2244) y definición de recaída y progresión de discapacidad.

Con respecto a la tasa anualizada de recaídas, cladribina fue asociado con una reducción estadísticamente significativa (p<0.05) del 58% en comparación con placebo. En comparación con otras DMT, cladribina mostró una reducción significativa en comparación con teriflunomida, todos los regímenes de IFN beta y acetato de glatiramer. Por otro lado, no se observaron diferencias estadísticamente



significativas al comparar cladribina vs dimetilfumarato, fingolimod, daclizumab, alemtuzumab, natalizumab y ocrelizumab (Ilustración 5).

Ilustración 5. Resumen de eficacia entre cladribina vs otros tratamientos en tasa anualizada de recaída.




Fuente: (Siddiqui, y otros, 2018)

En la población HRA+DAT, el uso de cladribina fue asociado a una reducción significativa de la tasa anualizada de recaída del 65% en comparación con placebo. Con respecto a otras DMT, se estimó un valor de 49% a 56% en comparación con teriflunomida, interferón beta 1 a y acetato de glatiramer. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre cladribina y alemtuzumab, fingolimod, dimetilfumarato y teriflunomida. En general, cladribina se clasificaron segundo detrás de natalizumab. El número necesario a tratar fue consistente entre las poblaciones general y HRA+DAT.

Con respecto a la progresión de la enfermedad confirmado por 6 meses a 24 meses, se observó que la mejoría al emplear cladribina fue significativa en comparación con placebo (HR)= 0.54, p<0.05). En comparación con las demás terapias, el uso de cladribina fue estadísticamente comparable (Ilustración 6).



Ilustración 6. Resumen de eficacia entre cladribina vs otros tratamientos en progresión de la enfermedad confirmado por 6 meses a 24 meses.



Fuente: (Siddiqui, y otros, 2018)

En pacientes con HRA+DAT, las tabletas de cladribina fueron asociadas con una reducción estadísticamente significativa (82%) en la tasa de progresión de la enfermedad confirmada a 6 meses, en comparación con placebo. Mientras que con los demás tratamientos, presentó resultados significativamente mejores vs alemtuzumab y IFN-beta 1a. Mientras que con las otras alternativas no pudo ser comparado debido a la falta de información.

En cuanto a la "No evidencia de actividad de la enfermedad a 24 meses", cladribina mostró eficacia superior al ser comparado con teriflunomida, dimetilfumarato, acetato de glatiramer, y natalizumab.

Por otro lado, en el análisis de seguridad no se observaron diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de presentar cualquier evento adverso entre cladribina y la mayoría de las DMT, calculado por medio de OR. El perfil de seguridad de cladribina fue comparable con el de todos los interferón-beta, acetato de glatiramer, alemtuzumab, PEG interferón-beta, y ocrelizumab. Sin embargo, el riesgo de presentar un evento adverso aumentó numéricamente al ser comparado con natalizumab y acetato de glatiramer. Es importante mencionar



que todos los intervalos de confianza de los OR reportados incluyeron al 1 (Tabla 29).

Tabla 28. Resumen de perfil de seguridad.

DMT	OR	ICr 95%
Natalizumab	2.70	0.96 – 7.93
Acetato de glatiramer 20mg	2.23	0.89 – 5.69
Placebo	1.59	0.76 – 3.34
Daclizumab	1.53	0.62 – 4.16
Teriflunomida 7 mg	1.38	0.55 – 3.43
Fingolimod	1.31	0.52 – 3.06
Teriflunomida 14 mg	1.21	0.48 – 3.05
Interferón β 1-a 30 mcg	1.13	0.49 – 2.81
Dimetilfumarato	1.02	0.39 – 2.7
IFN-beta 1b	0.81	0.04 – 15.52
Cladribina	NA	NA
Acetato de glatiramer 40mg	0.98	0.35 – 2.75
Ocrelizumab	0.67	0.12 – 3.31
Interferón β -1a 44 mcg	0.67	0.13 – 3.03
PEF Interferón β -1a	0.51	0.17 – 1.51
Alemtuzumab	0.72	0.05 – 1.47

Fuente: (Siddiqui, y otros, 2018)

De acuerdo a los análisis de sensibilidad realizados, no se presentaron cambios en la dirección de las diferencias entre los tratamientos. El resultado de la meta-regresión fue consistentes con el efecto observado en el análisis basal.

No evidence for higher risk of cancer in patients with multiple sclerosis taking cladribine. (Pakpoor, y otros, No evidence for higher risk of cancer in patients with multiple sclerosis taking cladribine., 2015)

Se presenta una revisión sistemática con meta-análisis cuyo objetivo fue comparar el riesgo de cáncer entre cladribina y distintos DMT empleados en el tratamiento de pacientes con EMRR.


Se realizó una revisión sistemática empleando como palabras clave "fase III" y "esclerosis múltiple". La búsqueda se llevó a cabo hasta marzo de 2014. Se incluyeron estudios clínicos aleatorizados que evaluaran el efecto de DMT en pacientes con EMRR y que reportaran tasa de neoplasmas o cáncer. Se excluyeron resúmenes de conferencias.

En total se incluyeron en el análisis 11 estudios clínicos fase III. Los DMT incluidos fueron acetato de glatiramer, cladribina, dimetilfumarato, fingolimod,



teriflunomida, natalizumab, alemtuzumab e interferón β -1a. La tasa de cáncer en el estudio CLARITY (donde se evalúa cladribina), no presentó diferencias en comparación con todos los brazos de tratamiento de los demás estudios incluidos (0.67%; p= 0.3669) (ver llustración 7).

Ilustración 7. Tasa de tumores malignos en los grupos de tratamiento de los estudios incluidos.



Fuente: (Pakpoor, y otros, No evidence for higher risk of cancer in patients with multiple sclerosis taking cladribine., 2015)

En el análisis se detectó heterogeneidad significativa entre los estudios localizados (12= 56.3%; p=0.009).

A1.3.3 Evaluación de la calidad de los estudios

Estimating the comparative efficacy of cladribine tablets versus alternative disease modifying treatments in active relapsing-remitting multiple sclerosis: adjusting for patient characteristics using meta-regression and matching-adjusted indirect treatment (Berardi, Siddiqui, Treharne, Harty, & Wong, 2019)

De acuerdo con la declaración de PRISMA, la publicación no mostró contar con un protocolo de registro del estudio, y en los resultados no se especifica la selección de estudios en un algoritmo, las características de los estudios, la evaluación de riesgo de sesgo, los resultados individuales de los estudios incluidos, o la evaluación



de sesgo entre los estudios. De esta manera el estudio cumplió con el 76% de los puntos propuestos en la declaración de PRISMA.

Systematic literature review and network meta-analysis of cladribine tablets versus alternative disease-modifying treatments for relapsing-remitting multiple sclerosis (Siddiqui, y otros, 2018).

De acuerdo a declaración de PRISMA, la publicación no mostró contar con un protocolo de registro del estudio. De esta manera el estudio cumplió con el 96% de los puntos propuestos en la declaración de PRISMA.

No evidence for higher risk of cancer in patients with multiple sclerosis taking cladribine. (Pakpoor, y otros, No evidence for higher risk of cancer in patients with multiple sclerosis taking cladribine., 2015)

De acuerdo a declaración de PRISMA, la publicación no contó con un título el cual identificara como revisión sistemática al estudio, no se presenta el registro del protocolo, en la metodología no se presenta la estrategia de búsqueda empleada, el proceso de selección de estudios, o el proceso de recolección de información, evaluación del riesgo de sesgo de los estudios. Complementariamente, en la sección de resultados, no se presenta la selección de estudios, las características de los estudios incluidos, el riesgo de sesgo de estos, o sus resultados individuales

De esta manera, el estudio cumplió con el 52% de los puntos propuestos en la declaración de PRISMA.

A1.3.4 Limitaciones

Hasta el momento, no existe evidencia clínica que compare de manera directa el uso de cladribina (MAVENCLAD®) en comparación con los comparadores especificados: alemtuzumab, fingolimod, natalizumab, y ocrelizumab.

En la revisión sistemática y meta-análisis de (Siddiqui, y otros, 2018) se expresa que no todos los estudios incluidos evaluaron población con HDA, por lo que el análisis de este subgrupo no incluye a todos los comparadores.

La metodología descrita en la revisión sistemática y meta-análisis de (Pakpoor, y otros, No evidence for higher risk of cancer in patients with multiple sclerosis taking cladribine., 2015), no detalla cómo se llevó a cabo el análisis de los datos. Además de presentar un alto grado de heterogeneidad, por lo que sus resultados se deberán de interpretar con precaución.



A1.3.5 Generalizaciones

Los meta-análisis incluidos evalúan todos los DMT aprobados en Europa y en Estados Unidos, incluyendo también aquellos que están incluidos en el CByCM en México.

La definición de población con EMRR con HDA entre las revisiones sistemáticas incluidas es consistente.

A1.4 Discusión y Conclusiones

La EMRR es una enfermedad desmielinizante con alto impacto en la discapacidad de los pacientes. Esto debido a un constante daño axonal, lo que conlleva a episodios clínicos de recurrencias, y la progresión de la enfermedad (Comi, Hartung, Kurukulasuriya, Greenberg, & Scaramozza, 2013). En México se ha reportado que la prevalencia de la EM oscila entre los 13 y 30 casos por cada 100,000 habitantes (Velázquez, Macías, Rivera, & Lozano, 2003) (Arrambide, y otros, 2004).

El impacto de la discapacidad sobre el paciente afecta su percepción sobre la calidad de vida, donde los síntomas que más lo perjudican incluyen: problemas de la marcha, problemas de equilibrio, tremor, vértigo, espasticidad, fatiga y depresión (Barin, y otros, 2018) (Isaksson, Ahlström, & Gunnarsson, 2005) (Göksel, y otros, 2011).

La población con HDA es un subgrupo de suma importancia debido a los factores de mal pronóstico que la acompañan, así como el fallo a DMT previos. Es por esto que la selección de un DMT altamente efectivo podría brindar un mejor control de la enfermedad para el paciente.

Cladribina (MAVENCLAD®) ha demostrado ser especialmente eficaz en pacientes con EMRR y HDA (Giovannoni, y otros, 2019). Por lo que es de especial interés comparar su eficacia y seguridad vs otras alternativas terapéuticas en este subgrupo de pacientes.

Al evaluar la tasa de recaídas y la progresión de la enfermedad, la literatura es consistente al reportar que cladribina (MAVENCLAD®) es similar a otros DMT de alta eficacia, como lo son alemtuzumab, fingolimod, natalizumab, y ocrelizumab.

Por otro lado, al evaluar la seguridad de distintos DMT, el estudio publicado por (Pakpoor, y otros, No evidence for higher risk of cancer in patients with multiple sclerosis taking cladribine., 2015) sugiere que cladribina (MAVENCLAD®) no presenta un mayor riesgo de presentar tumores malignos, en comparación de otros DMT. Complementariamente, el estudio de S también realizó un análisis de seguridad, donde se evaluaron los pacientes que presentaron cualquier evento adverso, sin mostrar diferencias estadísticamente significativas (Siddiqui, y otros, 2018).



En conclusión, cladribina (MAVENCLAD®) presenta un perfil de eficacia y seguridad similar a otras alternativas terapéuticas empleadas en el tratamiento de pacientes con EMRR con HDA, como lo son alemtuzumab, fingolimod, natalizumab y ocrelizumab.



Anexo 2. Ley del Impuesto al valor agregado.

De acuerdo con lo establecido en la "LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO", se incluye a continuación las especificaciones señaladas en la legislación.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DECRETO NÚMERO 27-92

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTICULO 8.* De las exenciones específicas. No deben cargar el impuesto en sus operaciones de ventas, como tampoco en la prestación de servicios, las siguientes personas:

- 1. * Los centros educativos públicos y privados, en lo que respecta a la matrícula de inscripción, colegiaturas y derechos de examen, de los cursos que tengan autorizados por la autoridad competente.
- 2. Las universidades autorizadas para funcionar en el país.
- 3. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco.
- 4. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
- 5. Las misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de la República, así como los agentes diplomáticos, los funcionarios y empleados diplomáticos y consulares, incluidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, con la condición de que los países a que pertenezcan dichas misiones y personas otorguen igual tratamiento como reciprocidad.
- Los organismos internacionales a los que de acuerdo con los respectivos convenios suscritos entre el Gobierno de la República de Guatemala y dichos organismos se les haya otorgado la exención de impuestos.
- * Corregido el numeral 7, por el numeral 5 de la Fe de Errata del 23 de junio de 1992.
- * Reformado totalmente por el artículo 5 del Decreto Número 60-94 del Congreso de la República, eliminando el numeral 7.
- * Reformado el numeral 1 por el artículo 151 del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República.



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NÚMERO 4-2012

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

DISPOSICIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y EL COMBATE A LA DEFRAUDACIÓN Y EL CONTRABANDO

LIBRO II

REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DECRETO NÚMERO 27-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Artículo 6. Se reforma el artículo 9, el cual queda así:

"Artículo 9. Régimen de las exenciones específicas. Las personas enumeradas en el artículo 8 anterior están exentas de soportar el impuesto que se genere por los actos gravados por esta Ley y deberán recibir de quien les venda o les preste un servicio, la factura que corresponda, pero no pagarán el monto del impuesto consignado en el documento, sino que entregarán a los mismos la constancia de exención debidamente autorizada por la Administración Tributaria.